

## Pestigon

### soluție spot on pentru pisici

#### Declarația substanței active și a altor ingrediente

Fiecare pipetă de 0.5 ml conține:

50 mg	Fipronil
0,1 mg	Butilhidroxianisol (E320)
0,05 mg	Butilhidroxitoluen (E321)

O soluție clară, incoloră spre gălbui pal.

#### Indicații

Pentru tratamentul infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides felis*). Produsul are efect insecticid imediat și acționează persistent împotriva infestațiilor noi cu purici până la 5 săptămâni.

#### Contraindicații

În absența informațiilor disponibile, produsul nu se va utiliza la pisici cu vârsta mai mică de 8 săptămâni și/sau greutate corporală sub 1 kg.

A nu se utiliza la animale bolnave (de ex. boli sistemice, stări febrile...) sau în stare de convalescență.

A nu se utiliza la iepuri, deoarece ar putea cauza reacții adverse și chiar decesul. A nu se utiliza în cazuri cunoscute de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

#### Reacții adverse

În cazul în care animalul linge zona de aplicare, se poate observa o scurtă perioadă de hipersalivație datorită, în principal, naturii solventului.

Printre efectele adverse extrem de rare, semnalate după folosirea produsului, se numără reacții cutanate tranzitorii în zona aplicării (decolorări ale pielii, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit generalizat sau alopecie. În cazuri excepționale, s-au observat, după utilizare, hipersalivație, simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase) vomă sau simptome respiratorii.

A nu se supradoza.

Dacă observați efecte grave sau alte efecte secundare care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

#### Specii țintă

Pisici.

#### Posologie pentru fiecare specie, cale și mod de administrare

Calea de administrare:


Se administrează prin aplicare locală pe piele. Aplicați produsul, în conformitate cu greutatea corporală a animalului, direct pe piele. Nu scoateți pipeta din plic până în momentul utilizării.

Dozare - 1 pipetă de 0.5 ml / pisică (aproximativ 7,5-15 mg/kg).

Modul de administrare: Țineți pipeta în poziție verticală. Apăsăți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că tot conținutul este în corpul pipetei. Rupeți capătul predecupat al pipetei spot-on de-a lungul liniei marcate.

Faceți o cărare în blană în regiunea dintre omoplați, până ce pielea devine vizibilă. Aplicați vârful pipetei pe piele și strângeți ușor, pentru a goli conținutul pe piele, de preferat în două puncte, unul la baza craniului și al doilea la o distanță de 2-3 cm.

Pentru a scoate din pliculeț, folosiți foarfecă sau



Îndoți pe diagonală pentru a expune linia crestată.

Rupeți trăgând la nivelul liniei crestate.

Răsuciți vârful pentru a deschide

Faceți o cărare în blană și aplicați pe piele.

#### Recomandări privind administrarea corectă

Este important să ne asigurăm că acest produs este aplicat într-o zonă în care animalul nu poate să lingă produsul și să ne asigurăm că animalele nu se ling unele pe celelalte după tratament. Se va avea grijă ca blana să nu fie umezită cu produs în mod excesiv, deoarece acest lucru poate cauza un aspect lipicios al blănii la locul de aplicare al tratamentului. Dacă acest fenomen apare, el va dispărea în 48 de ore după tratament. Pentru combaterea optimă a infestației cu purici și/sau căpușe, schema de tratament se va baza pe situația epidemiologică locală. În absența studiilor de siguranță, intervalul minim între tratamente este de 4 săptămâni. Animalele trebuie cântărite cât mai exact înainte de tratament.

**Timp de așteptare**

Nu se aplică.

**Precauții speciale pentru depozitare**

Nu lăsați la îndemână și la vederea copiilor.

Acest produs medicinal nu necesită condiții speciale de temperatură pentru depozitare.

Păstrați-l în cutia originală pentru a-l proteja de lumină și umezeală. A nu se utiliza după data expirării menționată pe etichetă.

**Atenționări speciale**

Produsul nu previne atașarea căpușelor de animale, dar căpușele vor fi omorâte în primele 24-48 de ore de la atașare, înainte de a ajunge la sațietate, reducându-se astfel riscul transmiterii bolilor. Odată omorâte, căpușele cad, de cele mai multe ori, de pe animal, iar cele rămase pot fi îndepărtate trăgând ușor. În cazul folosirii ca parte a tratamentului strategic pentru controlul dermatitei alergice produse de purici, se recomandă aplicări lunare la pacientul alergic și la ceilalți câini din casă. Pentru combaterea optimă a infestațiilor cu purici într-o casă cu mai multe animale de companie, toți câinii și toate pisicile din casă trebuie tratate cu un insecticid adecvat. Unele căpușe izolate pot rămâne pe animal. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase, în condiții favorabile acestora, nu poate fi exclusă în totalitate. Puricii de pe animalele de companie adesea infestază coșul animalului, culcușul și zonele în care stă de obicei, cum ar fi covoarele și obiectele moi de mobilier care trebuie tratate, în cazul infestațiilor masive și înaintea luării măsurilor de combatere, cu un insecticid adecvat și aspirate regulat. A se evita ca animalul să înoate sau să fie spălat cu șampon deoarece nu s-a testat menținerea eficacității produsului în aceste cazuri.

**Precauții speciale pentru utilizare la animale**

A se evita contactul cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți imediat și abundent cu apă. Numai pentru uz extern. Animalele trebuie cântărite cât mai exact înainte de tratament. Este important să ne asigurăm că acest produs este aplicat într-o zonă în care animalul nu poate să lingă produsul și să ne asigurăm că animalele nu se ling unele pe celelalte după tratament. Nu aplicați produsul pe pielea care prezintă răni sau leziuni.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Acest produs poate cauza iritarea mucoaselor și a ochilor. De aceea, trebuie evitat contactul produsului cu gura și cu ochii. În cazul unui contact cu ochii în mod accidental, clătiți imediat ochiul cu multă apă curată. Dacă iritația ochiului persistă, solicitați asistență medicală și arătați medicului prospectul din cutie sau eticheta. Oameni care prezintă o hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau la excipienți trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. A se evita contactul conținutului cu degetele. În cazul contactului, spălați mâinile cu apă și săpun. După utilizare spălați mâinile. A nu se fuma, bea sau mânca în timpul aplicării. Se va evita contactul direct cu animalele tratate până după uscarea locului în care a fost aplicat produsul iar copiilor nu li se va permite să se joace cu animalele tratate până după uscarea locului în care a fost aplicat produsul. De aceea se recomandă ca tratamentul să nu fie aplicat animalelor în timpul zilei, ci seara, iar animalelor tratate de curând să nu li se permită să doarmă în același pat cu stăpânii, în special, cu copiii.

**Utilizare în perioada de gestație sau lactație**

În absența studiilor de evaluare a siguranței acestui produs la animalele gestante sau în lactație, produsul va fi folosit numai în conformitate cu evaluarea raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar responsabil.

**Alte măsuri de precauție**

Fipronil poate fi dăunător organismelor acvatice. Câinii nu ar trebui să fie lăsați să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Alcoolul solvent poate avea efecte nedorite pe suprafețele vopsite, lăcuite sau alte suprafețe din casă sau mobilier. Nu s-au observat reacții adverse în cadrul studiilor de siguranță efectuate pe animale, la căței de 8 săptămâni, la câini care sunt în creștere sau la câini care cântăresc aproximativ 2 kg care au fost tratați în 3 ocazii diferite administrându-li-se de cinci ori doza recomandată. Riscurile de a prezenta efecte adverse pot crește însă atunci când doza o depășește pe cea recomandată, deci animalele trebuie să fie tratate mereu cu mărimea potrivită de pipetă în funcție de greutatea acestora. Acest produs este inflamabil. Țineți-l departe de căldură, scânteii, flacăra sau alte surse de aprindere.

**Numai pentru uz veterinar.****Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie deversat în cursuri de apă întrucât poate fi dăunător pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacuri, cursuri de apă sau canale de scurgere cu acest produs sau cu ambalajul golit.

**Date în baza cărora a fost aprobat ultima dată prospectul**

Iulie 2012.

**Alte informații****Modul de acțiune**

Fipronil este un insecticid/acaricid care aparține clasei fenilpirazolului. Acționează prin inhibarea complexului GABA, legându-se de canalul de clorură și blocând astfel transferul pre- și post- sinaptic de ioni de clorură la nivelul membranei. Acest efect duce la o activitate necontrolată a sistemului nervos central și moartea insectelor și a acarienilor.

**Informații privind ambalajul**

Pipeta de 0.5 ml, realizată dintr-o pelicula compusă din 3 straturi: unul din polipropilenă/COC/polipropilenă, lac laminat fără solvenți și unul din copolimer de polietilenă/EVOH/polietilenă. Pipetele sunt sigilate într-un pliculeț dificil de desfăcut de copii, realizat din folie compusă din 4 straturi: LDPE/nailon/folie aluminiu/poliester și prezentate într-o cutie exterioară.

Cutii cu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 sau 150 pipete.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

**Deținătorul autorizației de comercializare:**

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co Down, BT35 6JP, Regatul Unit

**Distribuit de:**

SC MARAVET SRL, 430000 Baia Mare, str. Maravet nr. 1

Tel/Fax: +40 262 211 964, www.maravet.com