

FIPREX SPRAY

1. COMPOZIȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fipronil 0.5 g,
vehicul q.s. 100.00 ml.

2. FORMA DE PREZENTARE

Spray.

3. PROPRIETĂȚI

Fipronil este un insecticid și acaricid din familia fenilpirazolului. Acționează prin inhibarea complexului GABA, legând canalele de clor și astfel blochează transferul pre- și postsinaptic al ionilor de clor de-a lungul membranei. Aceasta determină o activitate necontrolată a sistemului nervos central și consecutiv, moartea insectei.

Fipronil are acțiune insecticidă și acaricidă împotriva puricilor (*Ctenocephalides* spp), căpușelor (*Rhipicephalus* spp. *Ixodes* spp.) și păduchilor (*Trichodectes* spp. și *Fenicola* spp.) la câini și pisici.

4. SPECIILE ȚINTĂ

Câini, pisici.

5. INDICAȚII

Tratamentul și profilaxia infestațiilor cu purici și căpușe la câini și pisici.

Produsul este eficient față de *Ixodes* spp. inclusiv *Ixodes ricinus*, care are importanță epizootică, fiind vectorul intermediar pentru boala Lyme.

Produsul are eficiență rapidă în infestarea cu păduchele *Trichodectes canis* care parazitează câinii și păduchele *Fenicola subrostratus* care parazitează pisicile.

6. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Țineți copiii deoparte de animalele tratate până când blana lor devine uscată în totalitate.

Nu utilizați spray-ul în prezența flăcării deschise sau a oricăror materiale incandescente.

7. UTILIZAREA ÎN TIMPUL GESTAȚIEI ȘI LACTAȚIEI

Produsul este foarte bine tolerat de către cățelei ale căror mame au fost tratate.

8. INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE ȘI ALTE TIPURI DE INTERACȚIUNI

Nu sunt.

9. CALEA DE ADMINISTRARE

Spray prevăzut cu pompă mecanică, pentru uz extern.

Metoda de administrare: Ajustați pompa la tubul cu spray. Pulverizați pe întregul corp al animalului de la o distanță de aproximativ 10 – 20 cm. Aplicați în răspărul blănii animalului și asigurați-vă că întregul corp a fost acoperit. Periați blana, în special la animalele cu păr lung, pentru ca produsul să poată penetra până la piele. Pentru tratarea în regiunea capului și când tratați animale tinere sau nervoase, aplicarea produsului trebuie să se facă prin folosirea mânușilor și ștergerea sa pe păr. Așteptați uscarea naturală. Nu ștergeți pentru a usca.

Dozarea: produsul trebuie utilizat pe piele în doza de 1,5-3 ml per 1 kg greutate corporală (1-2 sprayeri din volumul de 250 ml și 3-6 sprayeri din volumul de 100 ml) această doză este echivalentă la 7,5-15 mg de fipronil per 1 kg greutate corporală.

Proprietăți: Formularea produsului conține un agent de acoperire. Așadar, prin sprayere se formează un film care îngroașă blana.

10. SUPRADOZARE, SIMPTOME ȘI ANTIDOTURI

Prin metoda de aplicare a produsului nu se poate produce supradozarea.

Studiile de toxicitate și toleranță arată că produsul poate fi utilizat în siguranță chiar dacă se depășește doza recomandată.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Numai pentru uz extern.

Evitați pulverizarea în ochii animalelor.

Nu utilizați direct pe zonele lezionate.

Permiteți uscarea blănii animalelor într-un spațiu bine ventilat.

Nu permiteți accesul animalelor într-un spațiu închis până când blana lor nu este uscată.

Trebuie evitată tratarea animalelor cu sensibilitate cunoscută față de produs.

12. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PERSOANELE CARE ADMINISTREAZĂ PRODUSUL ANIMALELOR

Pulverizați animalele în aer liber sau în spații bine ventilate.

Nu inspirați spray-ul.

În timpul utilizării este interzis consumul de alimente, băuturi sau fumatul.

Aruncați mănușile după utilizare, apoi spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.

Tineți copiii deoparte de animalele tratate, până la uscarea completă a blăniilor acestora.

Evitați pulverizarea în ochi sau pe pielea neprotejată.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu apă din abundență. Spălați imediat pulverizatul de pe piele cu apă și săpun. Dacă apar iritații, apelați la medic. Persoanele cu sensibilitate cunoscută, pot fi în mod deosebit sensibile și la acest produs. Nu utilizați produsul dacă ați avut în antecedent o reacție la acesta.

Tratarea mai multor animale: atunci când se tratează mai multe animale, este necesară o ventilație bună. Animalele în număr mai mare trebuie tratate în aer liber, sau reduceți formarea vaporilor prin îndepărtarea animalelor tratate din încăperea în timp ce alcoolul se evaporă, apoi asigurați-vă că între tratamente încăperea este bine ventilată. În plus, asigurați-vă dacă încăperea de uscare este bine ventilată și evitați introducerea animalelor recent tratate în același spațiu.

14. INCOMPATIBILITĂȚI

Nu se cunosc.

15. VALABILITATE

2 ani.

16. PĂSTRARE

Nu depozitați la temperaturi de peste 25°C.

Ferțiți de lumina solară directă.

17. MATERIALUL ȘI CONȚINUTUL FLACONULUI

Flacon cu conținut de 100 ml cu densitate mare de polyethylen, închis cu o pompă mecanică care permite pulverizarea dozei dorite de produs.

Flacon de 250 ml cu densitate mare de polyethylen, închis cu o pompă mecanică care permite pulverizarea dozei dorite de produs.

18. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU MANIPULAREA DEȘEURILOR

Deșeurile trebuie manipulate conform reglementărilor naționale în vigoare.

19. ALTE INFORMAȚII

Fipronil face parte din familia nesistemică de insecticide/acaricide cu spectru larg a fenilpirazolului, care acționează prin blocarea receptorilor GABA, pentru a ucide paraziții cu care vine în contact. Produsul poate contribui la controlul unor ectoparaziți la câini și pisici, inclusiv păduchi.

Produsul este activ până la 3 luni împotriva puricilor la câini și până la 2 luni la pisici, în funcție de modificarea factorilor de mediu. Este activ față de infestațiile cu căpușe timp de până la o lună la câini și pisici, în funcție de modificarea factorilor de mediu. Animalele pot fi tratate din nou la un interval care să nu fie sub o lună.

Cățele și pisicile în vârstă de peste două zile, pot fi tratate în siguranță.

Tratarea așternutului, a carpetei și a mobilierului textil cu un insecticid corespunzător, va permite reducerea modificărilor mediului și maximalizarea perioadei de protecție împotriva reinfestării asigurate de produs.

Produsul nu se pretează pentru tratarea directă a mediului.

Pentru eficiența maximă, nu se recomandă îmbăierea sau șamponarea animalului cu două zile înainte și după aplicarea produsului.

În absența datelor specifice de toleranță și eficiență a produsului, nu se recomandă utilizarea acestuia la alte specii în afară de pisici și câini.

Nu contaminați iazurile, canalizările sau canalele cu produsul sau cu flacoanele goale. Nu permiteți îmbăierea câinilor în iazuri sau în alte locuri cu apă timp de cel puțin 24 ore după aplicare.

20. PRODUCĂTOR

Vet-Agro Sp. z o.o.

Phone: +48 81 525 27 11

Fax: + 48 81 5382396

www.vet-agro.pl

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

070065 din 07.03.2007.

Importator exclusiv pentru România:

SC MARAVET SA, dr. Korponay F., 430016 Baia Mare, str. Maravet nr. 1, Tel/Fax: +40 262 211 964,

office@maravet.com,

www.maravet.com