

# NEUMOSUIN

vaccin inactivat împotriva pleuropneumoniei porcine

## 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135.

17170 AMER (Girona)

Spania

## 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

NEUMOSUIN

Vaccin inactivat împotriva Pleuropneumoniei Porcine.

## 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

### Ingrediente active/doză:

*Actinobacillus pleuropneumoniae* inactivat, serotipurile 2, 4 și 5.

A. serotype 2 MAT  $\geq 1/16$  ( $\geq 4 \times 10^9$  microorg.)

A. serotype 4 MAT  $\geq 1/16$  ( $\geq 4 \times 10^9$  microorg.)

A. serotype 5 MAT  $\geq 1/16$  ( $\geq 4 \times 10^9$  microorg.)

### Adjuvanți

Metabisulfid de Sodiu

Simethicon

Phenolsulfonphthaleină

Methyl parahidroxibenzoat de sodiu

Propyl parahidroxibenzoat de sodiu

PBS

## 4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

**Porcine:** prevenirea pneumoniei și pleuropneumoniei produse de *Ac. pleuropneumoniae*.

## 5. CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează porcii bolnavi.

## 6. REACȚII ADVERSE

Sporadic, la unele animale poate apărea o reacție anafilactică. În asemenea caz se va administra un tratament adecvat.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Porcine.

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Porci: 2 ml/animal, indiferent de greutate, vârstă sau sex.

Metodă de administrare: Injecție intramusculară profundă, în musculatura gâtului din spatele bazei urechii.

În general se recomandă următorul program de vaccinare:

### Ferme de reproducție:

Scroafe: se vaccinează cu 40-45 de zile înainte de a fata, și se revaccinează 21 de zile mai târziu (cu 20-25 de zile înainte de a fata). Revaccinarea se face cu aproximativ o lună înainte de următoarea fătare.

Vieri: se vaccinează toate animalele, și se revaccinează 21 de zile mai târziu. După aceea a se administra câte o doză la flectare 6 luni.

Purcei înțărcați: se vaccinează la vârsta de 40-45 de zile și se revaccinează la vârsta de 60-65 de zile.

Porci: se vaccinează toate animalele când ajung la fermă. Se revaccinează 3 săptămâni mai târziu.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

- A se agita înainte de utilizare.
- Se recomandă administrarea vaccinului la o temperatură cuprinsă între +15 și +25 °C.
- Pentru administrare trebuie să se folosească seringi și ace sterile

## 10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

- A se păstra la +2 to +8 °C.
- A se proteja de lumină.
- A se proteja de îngheț.
- A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă.
- Perioada de valabilitate după desigilarea flaconului: a se utiliza imediat.

**12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Vaccinați numai animalele sănătoase.

Nu există informații valide despre compatibilitatea acestui vaccin utilizat concomitent cu oricare alt produs medicinal veterinar. În cazul autoinjectării accidentale solicitați sfatul medicului imediat și arătați prospectul sau eticheta produsului.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar sau materialele provenite din acestea trebuie tratate conform legislației locale.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

Aprilie 2010

**15. ALTE INFORMAȚII**

Dimensiunea ambalajului:

Fl x 50 doze (100 ml)

Dispoziții legale:

A se elibera numai pe bază de prescripție medicală veterinară.