

STRESNIL 40 mg/ml

soluție injectabilă pentru porcine

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Eli Lilly Regional Operations GmbH.
Koelblgasse 8-10
1030 Vienna
Austria

Producător pentru eliberarea seriei:

Sanocheinia Pharmazeutika AG
Landegger Strasse 7
A-2491 Neufeld / Leitha
Austria

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Stresnil 40 mg / ml soluție injectabilă
Azaperone.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Fiecare ml conține:

Substanța activă:	Azaperone	40 mg
Excipient (excipienți):	Metil parahidroxibenzoat	0,5 mg
	Propil parahidroxibenzoat	0,05 mg

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Stresnil este indicat la porcine pentru:

1. Agresivitate

- Prevenirea și controlul agresivității și a luptelor de după regroupare.
- Tratamentul scroafelor agresive.

2. In diverse condiții (situații) legate de stres

- Supraîncărcarea cordului.
- Stress-ul cauzat de transport.

3. Obstetrică

Excitație în timpul parturirii. ca sprijin obstetrical (fătare manuala), prolaps vaginal, prolaps uterin, contracții patologice.

4. Premedicație în cazul anesteziei locale și generale

În combinație cu un hipnotic pentru a produce o stare de anestezie generală.

5. CONTRAINDICAȚII

Datorită unor posibile reziduuri în țesuturi, utilizarea Stresnil este contraindicată pentru transportul sau pentru regrouparea porcilor care urmează a fi sacrificați într-un interval de șapte zile după tratament. Utilizarea Stresnil trebuie evitată în mediu foarte rece datorită existenței potențialului de risc de colaps cardiovascular datorită vasodilatării periferice.

6. REACȚII ADVERSE

Nu există.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Porcine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru toate indicațiile, injecția se administrează strict intramuscular înapoia urechii. Trebuie folosit uri ac hipodermic lung și injectarea trebuie să se efectueze cât mai aproape posibil în spatele urechii și perpendicular pe piele.

Dacă sunt injectate în regiunea cervicală animale grele, corpulente folosind un ac scurt, există riscul injectării unei părți din medicament în stratul de grăsime. În acest caz, injecția poate avea un efect insuficient.

1. Agresivitate

- 1.1. Prevenirea și controlul agresivității și a luptelor de după regroupare
2 mg / kg (1 ml / 20 kg).

Prevenire

Porcii proveniți din cuiburi sau boxe diferite trebuie aduși împreună într-o boxă imediat după administrarea injecției cu Stresnil. După doar câteva minute aceștia se vor culca în decubit împreună, indiferent de originea lor. Ulterior, nu mai apar lupte violente. Totuși, trebuie tratate toate animalele. Doza indicată trebuie respectată. Dacă doza este prea mică, animalele vor fi sedate dar agresivitatea nu va fi estompată sau va fi diminuată doar temporar. Adăpostul (hala) trebuie închisă în timpul zilei de tratament. Vierii încă necastrați pot fi ușor agresivi după „trezire”. Dacă este necesar, trebuie administrată încă o doză de Stresnil. În mod obișnuit, după aceasta animalele vor rămâne complet în decubit. Purceii abia înțărcați pot fi injectați cu Stresnil în momentul sosirii în unitatea de îngrijire.

Control

Luptele dintre animale se vor calma în scurt timp după injectarea Stresnil. Animalele nu se vor mai lupta chiar și atunci când efectul produsului a dispărut.

1.2. Scroafe agresive: 2 mg / kg (1 ml / 20 kg)

Scroafa care nu-și acceptă purceii nou-născuți sau îi mușcă, îi va accepta pe aceștia, și chiar purceii proveniți din alt cuib, în decurs de o jumătate de oră până la o oră de la tratament. Totuși, scroafa trebuie abordată cu atenție pentru a nu se speria. Doza indicată trebuie respectată. Dacă doza este prea mică, animalele nu vor fi sedate în mod adecvat. Dacă doza este prea mare, acestea vor recidiva după „trezire”.

2. Stres

2.1. Supraîncărcarea cordului: 0,4 mg / kg (1 ml / 100 kg)

Curând după injecție, animalul devine liniștit. Tremurăturile dispar iar respirația devine profundă. Culoarea cianotică dispare progresiv și rata pulsului scade ușor. Este important să se trateze animalele imediat după ce au fost observate primele semne clinice (respirație accelerată). Dacă rezultatele nu sunt suficiente, trebuie administrată o a doua doză după un sfert de oră.

2.2. Transportul porcilor întărcați: 0,4 mg / kg până la 2 mg / kg (1 ml / 100 kg până la 1 ml / 20 kg)

O doză de 0,4 mg / kg, injectată cu 15 - 30 minute înainte de transport, reduce mortalitatea și pierderile de greutate în timpul transportului. Doza poate fi crescută până la 2 mg / kg pentru a se preveni luptele din timpul transportului. Animalele trebuie să aibă spațiu suficient pentru a se așeza în decubit iar camionul trebuie să aibă ventilație adecvată. Efectul produsului durează până la 2 - 3 ore după injectare.

Transportul vierilor: doză: 1 mg / kg (0,5 ml / 20 kg)

Animalele sunt injectate cu circa o jumătate de oră înainte de încărcare. În timpul perioadei de inducere animalele trebuie ținute separat. Animalele rămân somnolente timp de aproximativ două până la trei ore după injecție.

Nu se va injecta mai mult de 1 mg / kg. Supradozarea poate induce relaxarea penisului, care poate conduce la lezionarea acestuia.

2.3. Obstetrică: 2 mg / kg (1 ml / 20 kg)

- Excitare în timpul parturii cu întreruperea mecanismelor parturii.
- Sprijin obstetric (fătare manuală).
- Conracții patologice.
- Prolapsul vaginului, prolapsul uterin.

2.4. Premedicație cu anestezie locală și generală: 1 până la 2 mg / kg I.M. (0,5 până la 1 ml / 20 kg)

Atunci când este utilizat Stresnil pentru anestezie generală, doza anesteziei trebuie micșorată datorită efectului potențator al Stresnil-ului. Dacă rezultatele ce se obțin sunt insuficiente, trebuie reconsiderată tehnica de injectare (injecții profunde intramusculare) și acuratețea dozei folosite.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru toate indicațiile, injecția se administrează strict intramuscular în apoia urechii. Trebuie folosit un ac hipodermic lung și injectarea trebuie să se efectueze cât mai aproape posibil în spatele urechii și perpendicular pe piele.

Dacă sunt injectate în regiunea cervicală animale grele și corpulente folosind un ac scurt, există riscul injectării unei părți din medicament în stratul de grăsime. În acest caz, injecția poate avea un efect insuficient.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 7 zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri în care aceștia au acces.
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.
Flacoanele se păstrează în poziție inversă (răsturnate).
Valabilitatea după prima deschidere (în utilizare): 28 zile.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe eticheta.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Atenționări speciale pentru flecare specie țintă

Dacă se obțin rezultate insuficiente, trebuie reconsiderată tehnica de injectare (injecții intramusculare profunde, în apoia urechii) și acuratețea dozei folosite.

După injectare. În timpul perioadei de inducere, animalele trebuie lăsate singure, într-un mediu liniștit. Dacă animalele sunt deranjate sau alergate (gonite) în timpul perioadei de inducere, rezultatele obținute pot fi insuficiente.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

La vierii, nu trebuie depășită doza de 1 mg / kg.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-injecție accidentală solicitați imediat sfatul medicului, chiar dacă a fost injectată doar o cantitate mică și prezentați medicului prospectul produsului. Stresnil, ca și alte butirofenone, poate cauza sedare la om.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

În doza terapeutică, Stresnil nu are niciun efect advers asupra mecanismului parturii, lactației sau asupra instinctului maternal. Stresnil poate fi utilizat la animale gestante și în timpul perioadei de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Atunci când Stresnil este folosit ca premedicație pentru a produce o stare de anestezie generală, doza anesteziei trebuie micșorată datorită efectului potențator al Stresnil-ului.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În cazul supradozării pot apărea salivă și respirație sacadată. Aceste manifestări dispar spontan și nu conduc la afecțiuni ulterioare. La vieri, poate apărea relaxarea penisului după administrarea unei doze ce depășește 1 mg / kg. Aceasta poate rezulta în leziuni ale penisului.

Incompatibilități

A nu se amesteca cu nici un alt medicament în aceeași seringă.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Flacoane de sticlă tip I de 20, 50 sau 100 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.