

NOBILIS[®] EDS

vaccin inactivat, împotriva sindromului căderii ouatului la găini

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

NOBILIS[®] EDS, vaccin inactivat, împotriva sindromului căderii ouatului la găini

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Substanță activă:

Per doză de 0,5 ml:

Virusul EDS'76 inactivat, tulpina BC, care induce $\geq 6.5 \log_2$ unități IH (răspunsul serologic la puii de găină)

Excipienți:

Parafina lichida, polisorbitat 80, sorbitan mono-oleat, glicina, formaldehidă, apa pentru injectare

INDICAȚII

Pentru imunizarea activă a găinilor în vârstă de minim de 16 săptămâni, în vederea prevenirii mortalităților, simptomelor clinice și leziunilor specifice ale sindromului căderii ouatului

Instalarea imunității: 4 săptămâni de la vaccinare

Durata imunității: un ciclu de producție

CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările bolnave.

REAȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Găini

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Fiecare pasăre se vaccinează cu 0,5 ml vaccin, intramuscular (în musculatura pieptului sau piciorului) sau subcutanat (în treimea inferioară a feței dorsale a gâtului)

Nobilis[®] EDS se administrează găinilor de 16-20 săptămâni, cu cel puțin 4 săptămâni înainte de intrarea la ouat.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 - 25°C) și se va agita puternic. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

La temperatura de 2-8° C (la frigider). A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 3 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu se va amesteca cu alte vaccinuri.

În cazul unei injectări accidentale a celui care administrează sau unei alte persoane cu acest produs, poate să apară la locul injectării o reacție locală. Solicitați imediat sfatul medicului și informați medicul că produsul conține ulei mineral.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

ALTE INFORMAȚII

Flacoane ce conțin 250 ml pentru 500 doze sau 500 ml produs, suficient pentru 1000 doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L
Șos. de Centură nr.27 – 28,
Com. Chiajna., ILFOV