

Streptonamid plv. ad us. vet.

Compoziția calitativă și cantitativă

Sulfat de streptomicină 1 000 000 UI, ftalilsulfatiazol 1.0 g per plic (2.8 g).

Excipient: bentonită.

Forma farmaceutică

Pulbere pentru administrare orală.

Mecanismul de acțiune

Streptomicina - este produsă de bacteria *Streptomyces griseus*. Ea interferează cu inhibarea sintezei proteice prin afectarea funcției ribozomilor care sunt importanți pentru sinteza proteinelor și dezvoltarea bacteriană. Ftalilsulfatiazolul - în intestin, eliberează sulfatiazolul, care are efect bacteriostatic. Grupul funcțional al sulfonamidelor are efect de inhibare competitiv al acidului p-aminobenzoic, care este un factor de creștere al microorganismelor.

Substanțele active nu sunt absorbite în sistemul digestiv, efectul terapeutic al produsului are loc îndeosebi în lumenul tubului digestiv acționând intens asupra microflorei.

Indicații

Tratamentul bolilor infecțioase ale tractului digestiv cauzate de germeni sensibili la substanțele active conținute în produs, diaree și dizenterie la viței, enterită bacteriană a purceilor, tratamentul per os după administrările inițiale ale injecțiilor cu streptomicină.

Contraindicații

Viței peste vârsta de 3 luni (cu dezvoltarea prestomacelor).

Precauții speciale

Nu sunt.

Interacțiuni

Nu se cunosc.

Dozarea

Cai: 2 - 3 plicuri de două ori pe zi timp de 3 zile.

Vitei, mânji: 1 plic de două ori pe zi timp de 4 - 5 zile.

Purcei: 1/2 - 1/3 plic de două ori pe zi timp de 3 - 5 zile.

Câini: 1/2 - 1 plic de două ori pe zi timp de 4 - 5 zile.

Doza maximă zilnică și doza maximă totală:

Doza zilnică:

Cai: Streptomicină 6.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 6 g

Vitei, mânji: Streptomicină 2.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 2 g

Purcei: Streptomicină 1.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 1 g

Câini: Streptomicină 1.000.000 U.I. - 2.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 1 g - 2 g

Doza maximă pe durata întregului tratament:

Cai: Streptomicină 18.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 18 g

Vitei, mânji: Streptomicină 10.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 10 g

Purcei: Streptomicină 5.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 5 g

Câini: Streptomicină 5.000.000 U.I. - 10.000.000 U.I.

Ftalilsulfatiazol 5 g - 10 g

Calea de administrare

Orală. Înainte de furajare, amestecați produsul cu o cantitate mică de furaj sau apă.

Efecte secundare

Nu se cunosc efecte secundare.

Păstrare

Păstrați într-un loc întunecos la temperatura de 0 - 25°C, ferit de lumină. A se feri de accesul copiilor!

Prezentare

5 picuri x 2.8 g

Speciile țintă

Cai, mânji, viței, porci, câini.

Timp de așteptare

Carne -15 zile.

A nu se utiliza la caii a căror carne este destinată consumului uman.

Deșeurile

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor naționale în vigoare.

Valabilitate

2 ani de la data fabricației. A nu se folosi după expirarea valabilității trecute pe ambalaj.

Producător

Bioveťa, a.s. Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Republica Cehă

Data ultimei revizii a textului

14.05.2007

Numai pentru uz veterinar.

A se elibera numai pe bază de prescripție medicală.

Importator pentru România

SC MARAVET SRL

str. Maravet, nr. 1,

Tel/Fax: 0262-211.964

office@maravet.com www.maravet.com