

FELIBIO PCHR emulsie injectabilă pentru pisici

Compoziție

O doză de vaccin (1 ml) conține:

Substanțe active:

Virusul panleucopeniei contagiosae feline, inactivat, tulpina FPV RP ≥ 1

Calicivirus felin, inactivat, tulpina FCV F9 RP ≥ 1

Herpesvirus felin, inactivat, tulpina FHV-1 RP ≥ 1

Virusul rabiei inactivat, tulpina SAD VNUKOVO 32 min 1UI

RP = Potența relativă (test ELISA) prin comparație cu serul de referință obținut de la purcelușii de Guinea după vaccinare cu vaccinul propriu-zis, în baza testului cu infecție de control la animalele din specia țintă.

Adjuvanți:

Adjuvant uleios (Emulsigen) la 1 ml

Excipienți:

Tiomersal* 0,01 %

*) Conservantul este adăugat doar dacă același lot se folosește pentru ambalaje uni- și multi-doză.

Indicații

Pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecției cu virusul panleucopeniei feline, calicivirusului, herpesvirusului felin și rabiei.

Imunitatea împotriva panleucopeniei se instalează la 3 săptămâni de la vaccinarea de bază și imunitatea împotriva infecției cu calicivirus, herpesvirus și rabie se instalează la 4 săptămâni de la vaccinarea de bază.

Durata imunității este de 12 luni.

Contraindicații

Nu se va utiliza la animale care prezintă semne generale de boală febrilă.

Reacții adverse

După vaccinare, se poate observa apariția unei reacții locale (de dimensiunile unui bob de mazăre, de obicei), care dispare în 3 săptămâni de la vaccinare.

Doar în cazuri excepționale poate apărea hipersensibilitatea. În acest caz trebuie inițiat tratament adecvat.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Pisici

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

Doza de vaccin: 1 ml indiferent de rasă, greutate sau vârstă (dar nu la pisici cu vârstă mai mică de 8 săptămâni)

Mod de administrare: subcutanat, de preferat în zona din spatele omoplatului.

Înainte de utilizare, flaconul trebuie agitat bine.

Scema de vaccinare:

Vaccinarea de bază:

Două vaccinări la interval de 3 - 4 săptămâni la pisici cu vârsta cuprinsă între 8 și 10 săptămâni.

Se administrează o doză vaccin FeliBio PCHR în primele 3 luni, după administrarea de la vârsta de 8-10 săptămâni a unei doze de vaccin FeliBio PCH.

Revaccinarea:

Revaccinări regulate cu FeliBio PCHR se vor face apoi la intervale de 12 luni.

Recomandări privind administrarea corectă

Înainte de utilizare, flaconul trebuie agitat bine.

Timp de așteptare

Nu este cazul

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C).

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 8 ore.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă.

Atenționări speciale

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Se vor vaccina doar pisicile sănătoase, bine hrănite. Posibilele tratamente antiparazitare trebuie efectuate cu cel puțin 10 zile înainte de vaccinare. Se recomandă ca produsul să fie utilizat doar în prima jumătate a perioadei de gestație.

Nu sunt disponibile informații despre siguranța și eficacitatea utilizării acestui vaccin cu orice alt produs medicinal veterinar. Decizia de a utiliza acest vaccin înainte sau după orice alt produs medicinal veterinar trebuie luată de la caz la caz.

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal la animale

Pentru utilizator:

Acest produs conține ulei mineral. Auto-injecția/injecția accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injecția se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat.

În cazul unei injecții accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest produs conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injecția accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

Se recomandă ca produsul să fie utilizat doar în prima jumătate a perioadei de gestație.

Nu sunt disponibile informații despre siguranța și eficacitatea utilizării acestui vaccin cu orice alt produs medicinal veterinar. Decizia de a utiliza acest vaccin înainte sau după orice alt produs medicinal veterinar trebuie luată de la caz la caz.

Nu s-au înregistrat alte reacții adverse în afara celor menționate la secțiunea "Reacții adverse", după administrarea de doze de două ori mai mari.

Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea acestuia trebuie eliminat conform cerințelor locale.

Alte informații

Dimensiuni de ambalaje:

2 x 1 doză, 10 x 1 doză, 20 x 1 doză, 100 x 1 doză

1 x 5 doze, 5 x 5 doze, 10 x 5 doze

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Numai pentru uz veterinar. Produsul se va elibera pe bază de prescripție medicală veterinară.

Producător

Bioveta, a. s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Cehia.