

## Dimidovan 400 mg/g

**pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement și în apa de acvariu la pești ornamentali**

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producător responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

S.C. Vanelli S.R.L.

str. Iași-Tg-Frumos, km. 10

Lețcani, 707280 România

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIMIDOVAN, 400 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement și în apa de acvariu la pești ornamentali

Dimetridazol

### 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 g pulbere conține:

**Substanța activă:**

Dimetridazol 400 mg

**Excipienți:** glucoza monohidrat

### 4. INDICAȚII

Prevenirea (în efectivul în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infestațiilor cu protozoare flagelate, incluzând: *Trichomonas spp.* și *Hexamita spp.*, la porumbei voiajori și de agrement.

Tratamentul infestațiilor lor cu *Hexamita spp.*, *Oodinium spp.* și *Cryptobia spp.*, la pești ornamentali.

### 5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Produsul nu se utilizează la animalele destinate consumului uman.

### 6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt la doza recomandată.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

### 7. SPECII ȚINTĂ

Porumbei voiajori și de agrement, pești ornamentali

### 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare pe cale orală, în apa de băut și în apa de acvariu.

#### Porumbei voiajori și de agrement

- Prevenire: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp de 3-5 zile consecutive.

Pentru prevenirea introducerii parazitozelor în efectiv se recomandă administrarea medicamentului cu 3 săptămâni înainte de împerechere, de asemenea cu 3 săptămâni înainte și după sezonul de competiție.

- Tratament: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp de 7 zile consecutive.

În cazul în care boala continuă să apară, se administrează produsul câte o săptămână la fiecare lună de zile.

#### La peștii ornamentali

Tratament: 12,5 mg produs/litru apă, timp de 7 zile consecutive.

### 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pe perioada tratamentului se va utiliza numai apa medicamentată! Adăpătorile trebuie igienizate și păstrate curate.

## **10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina solară directă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: a se utiliza imediat.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

### **Precauții speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la dimetridazol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Pentru a se preveni orice efecte neplăcute, la manipularea sau administrarea produsului medicinal veterinar se recomandă purtarea mănușilor de protecție. În caz de contact accidental cu pielea, spălați bine cu apa zona afectată.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

### **Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare și alte forme de interacțiune**

Nu se utilizează simultan cu alte produse medicinale veterinare cu același spectru de acțiune.

### **Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Se va avea grijă pentru a evita supradozarea, în special în perioadele caniculare când păsările beau multă apă.

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

Mai 2019

## **15. ALTE INFORMAȚII**

### **Dimensiuni de ambalaj:**

#### Ambalaj primar

Flacon din HDPE, închis cu capac din același material de 50 g.

#### Ambalaj secundar

Cutie de carton cu 1 flacon x 50 g

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului avizului de comercializare.