

VITAMINA K₃ **soluție injectabilă antihemoragică**

1. COMPOZIȚIE

Substanța activă: Hetrazeen S (corespunzător la 0,5 g Menadiona) 2,2 g

Excipient (apă deionizată) ad 100 ml

2. ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ

Vitamina K₃ joacă un rol important în sinteza protrombinei hepatice și în procesul de coagulare, având astfel, un puternic efect antihemoragic; acționează asupra endotelilor capilare și asupra fibrinogenului. Carențele de vitamina K₃ determină hemoragii și hipoprotrombinemie. În doze mari, vitamina K₃ activează sistemul reticulohistiocitar, produce diureză (în edemele generale), stimulează funcțiile ficatului și a măduvei oaselor.

3. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici și păsări (găină, curcă, bibilică, prepeliță, fazan, păun, găscă, rață și porumbel)

4. INDICAȚII

Se recomandă la animale cu diateze hemoragice consecutive unor boli infecțioase, parazitare sau intoxicații.

Se recomandă în sindromul hemoragic la pui și tineretul aviar supus tratamentelor prelungite cu sulfamide sau antibiotice și ca adjuvant în tratamentul coccidiozei cu medicație specifică.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se recomandă la animalele cu afecțiuni hepatice.

6. REACȚII ADVERSE

Nu s-au constatat.

7. MOD DE ADMINISTRARE

Soluția de vitamina K₃ se administrează subcutanat sau intramuscular, în doză zilnică, astfel:

- la cabaline și bovine: 5 – 10 ml
- la porcine, ovine și caprine: 2 – 5 ml
- la câini și pisici: 1 – 2 ml
- la păsări (găină, curcă, bibilică, prepeliță, fazan, păun, găscă, rață și porumbel): 0,2 – 0,4 ml.

Tratamentul se aplică timp de 3 – 5 zile.

8. ATENȚIONĂRI

Soluția injectabilă de vitamina K₃ nu se amestecă cu alte soluții injectabile sau perfuzabile.

La porumbei, soluția se poate injecta la nivelul locului unde s-a produs hemoragia.

Prudență în administrarea la sugari și nou născuți.

9. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

10. MOD DE PREZENTARE

Flacoane cu 20, 50 și 100 ml.