

ROMPIL 1%, 10 mg/ml soluție injectabilă pentru cabaline și câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7

077190 Voluntari, Jud. Ilfov

România

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ROMPIL 1 %, 10 mg/ml soluție injectabilă pentru cabaline și câini.

Pilocarpină clorhidrat.

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Substanța activă

Pilocarpină clorhidrat 10 mg/ml

4. INDICAȚII

Se recomandă la cabaline în edem nespecific, furbura acută, indigestii în urma consumului de furaje insuficient maturate. Se poate folosi, de asemenea în glaucom pentru prevenția sinechiilor, dintre cristalin și țesuturile adiacente, ca și în oftalmia periodică.

La câine se folosește în constipații, ca purgativ.

Substanța activă, pilocarpină, se folosește, de asemenea ca antidot în intoxicații cu para simpaticolitice (atropină).

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în afecțiunile cardiace, pulmonare și la femele gestante, datorită efectului pe care îl are asupra musculaturii uterine.

Nu se administrează la cabalinele a căror carne și lapte sunt destinate consumului uman.

Nu se utilizează în colici la cal.

6. REACȚII ADVERSE

Salivație, mioza.

7. SPECII ȚINTĂ

Cabaline și câini.

8. DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

ROMPIL 1 % - soluție injectabilă se administrează subcutanat în următoarele doze:

- la cabaline: 3 - 20 ml, în funcție de talie dozele mari trebuie să divizate și administrate la intervale de 1 - 2 ore;

- la câini: 0,3 - 0,5 ml.

În oftalmia periodică (faza incipientă) în timpul acceselor se aplică sub formă de instilații în sacul conjunctival, în cantitate de 5-10 picături, alternativ cu midriatice (atropină).

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se va estima corect greutatea vie a animalelor pentru a se evita subdozările ori supradozările.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu se administrează la cabalinele a căror carne și lapte sunt destinate consumului uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original, în regim de "VENENA"

A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere: 7 zile.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

La câine administrarea pilocarpinei se face numai după o hidratare corespunzătoare a animalului. După injectarea produsului animalul nu trebuie să consume apă sau alimente circa 30 - 40 minute.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-injecție accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. Se vor respecta normele generale pentru prevenirea riscului biologic în utilizarea acelor, seringilor sau a altor materiale ce au venit în contact cu animalul tratat.

Utilizare în perioada de gestație și lactație

Nu se utilizează la femelele gestante datorită efectului pe care îl are asupra musculaturii uterine.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc

Incompatibilități

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu va fi amestecat cu alte produse medicinale veterinare

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATA CÂND A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Mod de prezentare: flacoane de sticlă (tip II, clasă hidrolitică) cu dop de cauciuc și capsă de aluminiu cu 10, 20 și 50 ml, ambalate individual în cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medical veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.