

Fluequin T

Compoziția:

1 ml (1 doză) de produs conține:

Substanțe active:

Virus influensis inactivat A/Equi 1/Praha 56,	min. 160 HAU
Virus influensis inactivat A/Equi 2/Morava 95 (Tipul european),	min. 320 HAU
Virus influensis inactivat A/Equi 2/Brno 97 (Tipul american),	min. 320 HAU
Anatoxină tetanică purificată	min. 150 UI

Adjuvant:

2-% gel de hidroxid de aluminiu, thiomersal, ser fiziologic.

Forma terapeutică

Soluție injectabilă.

Grupa farmacoterapeutică

Produs imunologic pentru uz veterinar.

Mecanismul de acțiune: Agenții constituenți activi ai vaccinului sunt hemaglutinine virale vaccinale, trei din cele mai răspândite tulpini ale influenței virale ecvine, precum și toxoida tetanică. Administrarea substanței active la speciile țintă, determină răspunsul imun activ și organismul devine protejat de către anticorpii specifici împotriva răspândirii infecției. Imnunitatea stabilă se instalează după 14 – 21 zile de la revaccinare; se menține activă pentru o perioadă de 6 luni pentru influența și un an pentru tetanos.

Indicații

Vaccinarea preventivă a căilor împotriva influenței și a tetanosului.

Contraindicații

Nu vaccinați animale bolnave.

Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare

Nu se cunosc.

Efecte secundare

Nu se cunosc.

Calea de administrare și dozarea

1 ml profund intramuscular.

Prima vaccinare (de bază) se va efectua la vârsta de 3 până la 6 luni, iar revaccinarea după 4 – 6 săptămâni mai târziu. Revaccinări ulterioare împotriva influenței se vor efectua la 6 – 12 luni, în funcție de situația respectivă privind incidența îmbolnăvirilor, iar împotriva tetanosului, odată la 12 luni. Iepele gestante trebuie revaccinate în ultimul trimestru al gestației, cel târziu cu o lună înainte de fătare.

Notă: Mânjii proveniți de la iepelile presupus vaccinate înainte de fătare, vor fi vaccinați la 6 luni, datorită imunității colostrale.

Precauții speciale

Agitați flaconul înainte de utilizare.

Valabilitatea

36 luni.

Timp de așteptare

Nu are timp de așteptare.

Prezentare

Flacoane a :	2 x 1 doze
	5 x 1 doze
	10 x 1 doze
	1 x 5 doze
	10 x 5 doze
Seringi a:	2 x 1 doze
	10 x 1 doze

Păstrare

Depozitați la loc întunecos și uscat, la temperatura de 2 până la 8°C. Nu expuneți vaccinul la temperaturi de peste 8°C timp îndelungat.

Măsuri pentru manipularea produsului expirat sau neutilizat

Manipularea ambalajelor cu produse nefolosite sau expirate se face conform normelor naționale în vigoare.

Producător:

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.