

Nobilis ND Clone 30

vaccin viu impotriva bolii de Newcastle, pentru gaini si curci

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producător:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis ND Clone 30, vaccin viu impotriva bolii de Newcastle, pentru gaini si curci

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Substanță activă/doza: virusul viu al bolii de Newcastle, Clona 30, minim 6.0 log₁₀ ELD₅₀ - maxim 8.0 log₁₀ ELD₅₀

Excipienti:

Sorbitol

Gelatina hidrolizata

Cazeina pancreatică

Fosfat disodic dihidrat

Apă pentru injecții

INDICAȚII

Vaccinarea puiilor de găină și curca sănătoși, în vederea prevenirii mortalităților, simptomelor clinice și leziunilor specifice bolii de Newcastle.

La pasari instalarea imunitatii se dezvolta dupa aproximativ 3 saptamani si durează aproximativ 6 săptămâni.

CONTRAINDICAȚII

Nu există

REAȚII ADVERSE

Consecutiv administrării vaccinului pot să apară reacții respiratorii de intensitate mică.

Intensitatea și durata reacțiilor post-vaccinale depind de starea de sănătate a păsărilor și de starea lor de întreținere.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Gaini si curci

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Fiecare pasare se vaccinează cu o doză de vaccin. Calele de administrare sunt următoarele:

- prin aerosoli
- prin apa de băut
- oculo/nazala

Program de vaccinare:

În funcție de situația epidemiologică, se recomandă:

a) În zone cu un risc ridicat al infecției cu virusul bolii de Newcastle:

- prima vaccinare prin aerosoli, la vârsta de 0 zi;
- a doua vaccinare prin aerosoli, la vârsta de 3-4 săptămâni.

b) În zone fără risc de infecție cu virusul bolii de Newcastle:

- în zonele în care evoluează infecții cu Mycoplasme:
 - prima vaccinare, prin administrare în apa de băut sau prin instilații nazale, la vârsta de 2-3 săptămâni;
 - a doua vaccinare prin administrare în apa de băut, la vârsta de 7-8 săptămâni.
- în zonele cu risc scăzut de infecții respiratorii:
 - vaccinare prin aerosoli, la vârsta de 1-2 săptămâni. Pentru broileri este suficientă o singură vaccinare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Spălați și dezinfectați mâinile după utilizarea acestui vaccin.

Evitați contactul cu virusul vaccinal cât mai mult posibil.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura de 2°C- 8 °C.

A se proteja de lumină.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 2 ore.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu se vaccinează pasările bolnave

A nu se utiliza la găini și curci în timpul perioadei de ouat.

Tulpina Clona 30 a virusului bolii de Newcastle poate fi folosită în același timp cu tulpina Ma 5 a virusului bronșitei infecțioase aviare. Între două vaccinări succesive cu vaccinuri diferite trebuie să existe un interval de cel puțin 14 zile.

Nu au fost observate reacții adverse grave ca urmare a administrării a 10 sau 100 doze vaccinale.

A nu se amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugearea deșeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.

ALTE INFORMAȚII

Cod ATC: QI01AD06

Cuții cu 1, 10 și 50 flacoane, fiecare conținând 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 și 10 000 de doze

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L

Șos. de Centură nr.27 – 28,

Com. Chiajna., ILFOV