

Ketofen

10% soluție injectabilă pentru bovine, cabaline și suine

Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și a deținătorului autorizației de fabricare, responsabil pentru eliberarea seriilor de produs, dacă sunt diferite

Deținătorul autorizației de comercializare: Merial, 29 Avenue Tony Garnier, FR-69007 LYON, Franța.

Producător responsabil pentru eliberarea seriei: Merial, 4 Chemin du Calquet, FR-31300 Toulouse, Franța.

Denumirea produsului medicinal veterinar

Ketofen 10% soluție injectabilă pentru bovine, cabaline și suine
(Ketoprofen)

Declararea substanței active și a altor ingrediente

1ml de KETOFEN 10% conține:

Substanța activă:

Ketoprofen 100 mg

Excipient:

Alcool benzilic 10 mg

Indicații

Bovine: tratamentul afecțiunilor inflamatorii acute și dureroase.

Cabaline (Cai de curse și de agrement): tratamentul afecțiunilor inflamatorii acute și dureroase provocate de bolile musculo-scheletale; tratamentul simptomatic al colicilor; tratamentul simptomatic al febrei.

Suine: tratamentul afecțiunilor inflamatorii; ex. Sindromul mastite – metrite –agalaxie (MMA) și infecții respiratorii; tratamentul simptomatic al febrei.

Contraindicații

Nu se utilizează la animalele cu ulcer gastro-duodenal sau sindroame hemoragice.

Nu se utilizează la animalele cu insuficiență renală severă.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la ketoprofen.

Nu se utilizează la caii destinați consumului uman.

Reacții adverse

Nu există.

Specii țintă

Bovine, suine, cabaline (cai de curse și de agrement).

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Bovine: 3 mg substanță activă pe kg greutate corporală, zilnic timp de 1 până la 3 zile consecutive, pe cale intramusculară sau intravenoasă, (ex. 3 ml Ketofen 10% / 100 de kg).

Cabaline (Cai de curse și de agrement): 2.2 mg substanță activă pe kg greutate corporală, zilnic timp de 3 până la 5 zile consecutive, pe cale intravenoasă, (ex. 1 ml Ketofen 10%/ 45 de kg).

Pentru tratamentul colicilor, în general este suficientă o singură injecție. Orice alte injecții suplimentare trebuie administrate numai după evaluarea clinică a animalului.

Suine: o singură administrare intramusculară în doza de 3 mg substanță activă pe kg greutate corporală, (ex. 3 ml Ketofen 10%/ 100 de kg)

Timp de așteptare

Bovine

Carne și organe: 4 zile

Lapte: 0 mulsori

Suine:

Carne și organe: 4 zile

Cabaline: a nu se utiliza la animalele destinate consumului uman.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

După prima deschidere, se va utiliza până la 28 zile.

Atenționări speciale

A nu se utiliza la iepi gestante.

În absența studiilor de toleranță specifice mânjilor, utilizarea produsului nu se recomandă mânjilor cu vârsta mai mică de 15 zile.
Nu se utilizează împreună cu alte medicamente antiinflamatoare, diuretice sau anticoagulante.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Alte informații

Numai pentru uz veterinar.

Ambalare

Flacon de sticlă maro de: 10 ml, 50 ml, 100 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.