

# NOBILIS REO inac

VACCIN INACTIVAT impotriva Reovirozei aviare

## NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Olanda

## DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

### NOBILIS REO inac

VACCIN INACTIVAT impotriva Reovirozei aviare

## DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Reovirusul aviar - tulpinile 1733 și 2408 care induc un titru  $\geq 7,4 \log_2$  unitati ELISA

Parafina lichida  
Polisorbat 80  
Sorbitan mono-oleat  
Glicina  
Formaldehida  
Apa pentru injectii

## INDICAȚII

Pentru imunizarea activa a gainilor in vederea prevenirii mortalitatii, semnelor clinice si/sau leziunilor specifice reovirozei aviare. Găinile dezvoltă imunitate de protecție împotriva Reovirusul aviar după 4 săptămâni de la vaccinare și durează cel puțin o perioadă de ouat.

## CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul nu se administrează cu mai puțin de 2-4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.

## REAȚII ADVERSE

La pasările sanatoase nu s-au observat reacții adverse. La locul injectării poate să apară o inflamație ușoară (<1 cm) care poate dura până la 3 săptămâni.

## SPECII ȚINTĂ

Găini

## POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Fiecare pasăre se vaccinează intramuscular (în piept sau în picior) sau subcutanat (pe fața dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin Nobilis Reo inac.

### Program de vaccinare

Nobilis Reo inac se administrează în jurul vârstei de 16-20 săptămâni (la transfer). Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre vaccinarea cu virus viu și cea cu virus inactivat este mai mare de 6 săptămâni.

## RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15-25°C) și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

## TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile

## PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
La temperatura de 2-8°C (la frigider), la întuneric și ferit de îngheț.  
Flacoanele deschise se folosesc în interval de 3 ore.  
A nu se folosi după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

## ATENȚIONĂRI SPECIALE

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15-25°C) și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

În caz de auto-injecție accidentală sau de injectarea accidentală a altei persoane poate apărea o reacție locală.

Este indicat să solicitați imediat sfatul medicului și să îl informați că vaccinul este o emulsie apă în ulei.

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar.

A nu se folosi la gaini cu mai puțin de 2-4 săptămâni înainte de începerea ouatului.

## PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## ALTE INFORMAȚII

Grupa farmacoterapeutică: Vaccin inactivat impotriva Reovirozei aviare

Codul veterinar ATC: QI01AA04

Flacoane de 500 ml pentru 1000 doze.

Flacoane de 250 ml pentru 500 doze.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare:

Intervet România S.R.L  
Șos. de Centură nr.27 – 28,  
Com. Chiajna., ILFOV