

PROCAROM 2%

soluție injectabilă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine și câini

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Procarom 2%, 20 mg/ml soluție injectabilă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine și câini.

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Substanța activă: Procaina clorhidrat 20mg/ml.

3. INDICAȚII

În tratamentul durerii prin infiltrații locale în anestezia tronculară și în anestezia epidurală (distocii, prolapsuri, intervenții chirurgicale la cabaline, bovine, ovine, caprine, suine și câini).

Intravenos pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, a fibrilațiilor cardiace, a spasmului coronarian și a colicilor.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.

Nu se administrează la animale cu insuficiență hepatică, meningită, în stare de șoc.

5. REACȚII ADVERSE

Pot apărea reacții la animalele alergice.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar!

6. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine și câini.

7. DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

- În anestezia de infiltrație, Procarom 2% se injectează în jurul focarului dureros, sau a locului de intervenție chirurgicală, în cantități de 2-4 ml în fiecare loc la bovine și cabaline
- În anestezia epidurală se folosesc 5-10 ml pentru fiecare intervenție făcută pe animale în picioare, sau 10-20 ml pentru intervențiile făcute pe animale care trebuie să stea culcate.
- În colici administrarea intravenoasă se face lent, în doză de 10-30 ml.
- În operațiile cezariene, straturile anatomice de la locul de elecție al intervenției chirurgicale se infiltrază strat cu strat, folosind 10-30 ml de Procarom 2%, în funcție de talia animalului.
- Anestezia pe traiectul nervilor, se realizează injectând 5-15 ml, cât mai aproape de nervul care inervează zona.
- La suine și capre, pentru operații cezariene, se realizează infiltrarea straturilor anatomice, folosind 5-15 ml Procarom 2%.
- La câini se realizează infiltrarea straturilor anatomice, folosind 0,5-3 ml în funcție de talie.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine
Carne și organe – 0 zile
Lapte – 0 zile

Câini: Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 25° C în ambalajul propriu.

A nu se folosi după perioada de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 7 zile.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZAREA LA ANIMALE

Injectarea intravenoasă a produsului se face foarte lent.

Se utilizează cu prudență la animalele alergice.

Utilizarea în perioada de gestație și lactație.

Se poate utiliza în perioada de gestație și lactație.

11. SUPRADOZARE

Se vor respecta dozele recomandate.

În cazul intoxicației acute trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

Nu se asociază cu macrolide, sulfamide sau trimetoprim.