

CANGLOB D FORTE inj.ad us.vet.

Imunoglobulină heterogenă hiperimună împotriva bolii Carré, destinată câinilor și canidelor de pradă.

Compoziția:

Fiecare 1,0 ml din produs conține:

Ingrediente active:

- Imunoglobulinum anti febris contagiosae canis NLT 320 VNAb₅₀.

Excipienți:

- Tiomersal NMT 0,1 mg; soluție de diluare până la 1 ml.

Forma farmaceutică:

Injectie.

Grupa farmacoterapeutică și modul de acțiune

Grupa farmacoterapeutică:

Imunopreparat veterinar.

Codul ATC veterinar: Q15AA.

Proprietăți farmacodinamice: Produsul conține anticorpi specifici heterogeni care induc o imunitate pasivă împotriva bolii Carré. Anticorpii sunt complet disponibili după administrarea parenterală. În funcție de modul de administrare al produsului imunitatea pasivă se dezvoltă iar durata ei depinde de cantitatea administrată precum și de frecvența administrării ei.

Particularități farmacocinetice: Administrarea intravenoasă permite înregistrarea unei imunități pasive imediate, utilizarea imunoglobulinei fiind maximă. După administrarea intramusculară și subcutanată se înregistrează o instalare ușor întârziată a imunității pasive a cărei utilizare este mai mică față de cea consecutiv administrării intravenoase.

Imunoglobulinele sunt distribuite prin circulația sanguină în organism și sunt metabolizate treptat și eliminate ca proteine heterogene.

Ingredientele inactivate sunt metabolizate după imunizarea animalelor prin degradarea și excrețarea lor din organism.

Proprietăți referitoare la mediul înconjurător: produsul nu are influență asupra mediului.

Indicații:

Produsul este destinat pentru imunizarea pasivă a câinilor și canidelor împotriva jigodiei. Produsul este utilizat pentru tratamentul și profilaxia jigodiei, precum și pentru profilaxia imediată a animalelor în cazul în care un agent etiologic al bolii nu a fost clar detectat. Anticorpii specifici previn apariția bolii sau, în cazul în care deja există, ușurează evoluția sa. Pentru un tratament de succes este importantă administrarea sa timpurie.

Dozarea se va face conform greutatei animalului, indiferent de speciile țintă, categorie, vârstă sau sex.

Contraindicații:

Administrarea produsului reprezintă în general un stres imunobiologic considerabil pentru animal. În cazul administrării repetate a produsului, animalele pot fi sensibilizate și pot fi înregistrate reacții anafilactice. Produsul este contraindicat mai ales în scop profilactic, la animalele sensibile sau în cazul apariției reacțiilor alergice și anafilactice în urma administrării repetate. Contraindicațiile trebuie luate în seamă de către medicul veterinar cu ocazia evaluării severității evoluției unei boli și riscul tratamentului cu acest produs.

Reacții adverse:

Reacția generală a organismului se poate caracteriza prin subfebrilitate, inapetență tranzitorie și slăbire generală.

Rareori, administrarea produsului poate induce reacții alergice sau anafilactice – care se datorează îndeosebi administrării repetate. Pentru ameliorarea reacțiilor adverse, se recomandă tratamentul simptomatic. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Speciilitate:

Câini și canide.

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare:

Doza terapeutică este de 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală indiferent de speciile țintă, vârstă și sex.

Produsul se va administra intravenos, intramuscular sau subcutanat. Doza terapeutică este 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală zilnic, până la îmbunătățirea stării de sănătate. Doza profilactică este 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală, administrată la un interval de 5 zile. Se poate utiliza în caz de pericol iminent al bolii. Doza maximă este de 0,4 ml de produs per 1 kg greutate corporală și poate fi utilizată atât pentru tratament cât și pentru profilaxie.

Recomandări privind administrarea corectă:

Înainte de utilizare, produsul trebuie încălzit la temperatura mediului și agitat. Doza imunizantă trebuie preparată și prelevată din recipient și administrată utilizând tehnici aseptice.

Termen de așteptare:

Nu este pentru animale destinate consumului uman.

Utilizarea în perioada de gestație sau lactație:

În afară de reacțiile generale și sporadice, nu se cunosc alte riscuri datorate imunizării pasive ale femelelor gestante și ale femelelor după parturire. În ciuda acestui fapt, nu este recomandabil să se folosească produsul în stadiile avansate ale gestației și imediat după parturire. Imunizarea femelelor se poate efectua în stadiile incipiente și medii ale gestației. Imunizarea pasivă a femelelor nu are influențe majore asupra protecției progenilor prin imunitatea colostră. Anticorpii specifici obținuți prin imunizarea pasivă nu se transmit activ căteilor, prin colostru. Acești anticorpi nu exercită reacții adverse la căței.

Precauții speciale pentru depozitare:

A se depozita într-un loc uscat și întunecos, la temperatura de 2 - 8°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul trebuie utilizat în intervalul valabilității produsului menționat pe etichetă, respectiv în 18 luni.

Valabilitatea produsului după deschiderea ambalajului este de 10 ore.

Atenționări speciale:

Precauții speciale pentru utilizare la animale: administrarea imunoglobulinelor heterogene stimulează imunitatea pasivă, pentru o perioadă ce nu depășește 7 zile. În această perioadă, nu este recomandată vaccinarea împotriva bolii pentru care produsul a fost destinat. Calea de administrare și durata tratamentului sau cea de protecție profilactică, trebuie stabilite de către medicul veterinar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de auto-rănire accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta. Se recomandă dezinfectarea locului rănit.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Alte informații:

Numai pentru uz veterinar!

A se elibera doar pe baza de prescripție medicală!

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Natura și compoziția ambalajului primar:

Tipul ambalajului: Produsul se prezintă în recipiente medicinale din sticlă sau plastic. Sticlele medicinale sunt închise cu dopuri din cauciuc peste care este aplicată o capsă din aluminiu. Un număr corespunzător de sticle sunt ambalate de asemenea într-o cutie de carton. Ambalajul conține prospect și etichetă ce trebuie aplicată pe cardul de vaccinare.

Mărimea ambalajului:

1 flacon x 5 ml, adică 5 ml de produs în fiecare flacon a 7 ml;

1 flacon x 6 ml, adică 6 ml de produs în fiecare flacon a 7 ml;

6 flacoane x 5 ml, adică 5 ml de produs în fiecare din cele 6 flacoane a 7 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Producător:

DYNTEC spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Republica Cehă.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !