

Rabisin

Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și a deținătorului autorizației de fabricare, responsabil pentru eliberarea seriilor de produs, dacă sunt diferite

Deținătorul autorizației de comercializare: MERAL, 29 Avenue Tony Garnier, FR-69007 LYON, Franța.

Producător responsabil pentru eliberarea seriei: MERAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, F-69800 Saint Priest, Franța

Denumirea produsului medicinal veterinar

Rabisin.

Declarația (substanței) substanțelor active și a altor ingrediente

Fiecare doză de vaccin conține:

Glicoproteine rabice	≥ 1UI
Aluminiu (hidroxid)	1,7 mg
Tiomersal*	≤ 0.1 mg

*Numai pentru prezentarea multidoză (RABISIN 10 Doze)

Excipient: q.s 1 ml

Indicație

Imunizarea activă împotriva rabiei a câinilor, pisicilor, mustelidelor, bovinelor, cailor, oilor.

Contraindicații

A nu se administra subcutanat la cai.

Reacții adverse

- Ca la orice alt vaccin pot apărea reacții de hipersensibilitate. Acestea sunt rare și necesită administrarea unui tratament simptomatic.
- Prezența hidroxidului de aluminiu poate uneori provoca formarea unui nodul trecător la locul injecției.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Câini, pisici, mustelide, bovine, cai și ovine.

Posologie pentru fiecare specie, căi de administrare și mod de administrare

Se injectează subcutanat (cu excepția cailor) sau intramuscular o doză de 1ml în conformitate cu următorul program de vaccinare.

Speciile	Vârsta minimă de vaccinare		Rapeluri
	Născut din mamă care nu a fost vaccinată	Născut din mamă care a fost vaccinată	
Câini, pisici și mustelide	4 săptămâni	11 săptămâni	La fiecare 1, 2 sau 3 ani în conformitate cu legislația din fiecare țară
Bovine, cai și ovine	4 luni	9 luni	

Recomandări privind administrarea corectă

Nu există.

Timp de așteptare

Zero zile.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

Atenționări speciale

A se vaccina numai animalele sănătoase, deparazitate intern cu cel puțin 10 zile înainte de vaccinare.

Nu au fost raportate reacții adverse la femele în perioada de gestație.

Nu au fost observate efecte adverse după administrarea mai multor doze de vaccin.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Alte informații

Proprietăți imunologice

Vaccin inactivat adjuvant împotriva rabiei.

Vaccinul induce starea de imunitate împotriva rabiei, fapt dovedit prin infecție de control și prin prezența anticorpilor.

Numai pentru uz veterinar.

A se elibera numai pe bază de rețetă medicală veterinară.