

# Taktic®

## Antiparazitar extern.

### Descriere

Taktic® se prezintă sub forma unui flacon ce conține o emulsie concentrată de culoare maronie cu miros pătrunzător.

### Compoziție

1 litru conține 125 g amitraz, substanță activă.

### Indicații

În prevenirea și combaterea ectoparaziților la suine, bovine, ovine și caprine.

### Mod de acțiune

Amitraz este un insecticid-acaricid din grupa formamidin. Interacțiunea cu receptorii octapamin din sistemul nervos central al ectoparaziților intensifică activitatea neuronală până la paralizie și moarte.

### Doze și mod de administrare

Taktic se poate administra în două moduri:

- spray: suine, bovine, ovine, caprine;
- îmbăiere: bovine, ovine, caprine.

#### Metoda spray

##### Suine

- în ziua planificată pentru tratament, se amestecă 40 ml cu 10 L apă;
- se golesc adăpătorile și hrănitorile și se acoperă; se îndepărtează așternutul și se curăță jgheburile;
- se tratează toate animalele în același timp, folosind suficient spray, insistând în zona urechilor, grebăn și între membrele anterioare;
- se pulverizează pereții și podeaua adăpostului.

Tratamentul se repetă la după 7-10 zile.

Tratamente profilactice de rutină:

- vieri de reproducție: la fiecare 2-3 luni;
- scroafe și scrofițe: când se introduc în compartimentele pentru fătare;
- tineret: după înțârcare sau după transferul în îngrășătorii;
- porci nou achiziționați: se izolează și se tratează înainte de a fi introduși în efectiv;
- clădiri: spațiile goale se pulverizează cu 80ml/10 L de apă.

##### Bovine

- în ziua planificată pentru tratament, se amestecă 20 ml cu 10 L apă;
- se pulverizează tot corpul animalului până se udă complet;
- în infestații masive cu păduchi sau scabie tratamentul se repetă după 7-10 zile.

##### Ovine și caprine

- în ziua planificată pentru tratament, se amestecă 40 ml cu 10 L apă;
- se pulverizează tot corpul animalului până se udă complet.

#### Metoda îmbăierii

##### Bovine

- în ziua planificată pentru tratament, bazinele se umplu inițial cu 1L/500 L apă;
- când volumul scade cu 20%, reumplerea se realizează cu 1,5 L/500 L apă;
- dacă îmbăierea se face în altă zi, soluția se stabilizează adăugând câte 5 kg hidroxid de calciu (min. 80%) pentru fiecare litru de Taktic olosit în amestec.

##### Ovine și caprine

- este metodă specifică ovinelor;
- bazinele se umplu inițial cu 1 L/250 L de apă;
- când volumul inițial scade cu 20%, reumplerea se realizează cu 1,5 L/250 L apă;
- îmbăierea se face la toate oile dintr-o turmă o dată.

### Contraindicații

Nu se administrează la cabaline. Nu se tratează animalele oboșite sau însetate.

### Efecte adverse

Nu sunt.

### Incompatibilități și interacțiuni

Nu se cunosc.

### Precauții

Îmbăierea nu se face în orele călduroase ale zilei. Persoanele care manipulează produsul vor evita contactul cu pielea sau ochii. În timpul anipulării este interzis fumatul, consumul de mâncare sau lichide.

### Perioada de așteptare

Carne: bovine și caprine 24 ore de la ultimul tratament;  
ovine și suine 7 zile de la ultimul tratament.

Lapte: 7 ore de al ultimul tratament.

### Supradozare

Se va evita supradozarea.

**Păstrare**

La temperatura camerei (15-25°C), la întuneric în recipientii originali, închiși ermetic. Nu se depozitează împreună cu alimente, apă sau uraje.

**Prezentare**

Flacon de 250 ml și bidon de 5 L.

**Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje**

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.