

ENTEROGUARD M

comprimate pentru câini, pisici, păsări de colivie și voliera (canari, papagali porumbei voiajori și de ornament, nurci, dihori metronidazol, oxitetraciclina clorhidrat, furazolidonă

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.
Șos. Centurii nr. 7
077190 Voluntari, Jud. Ilfov
România

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ENTEROGUARD M, comprimate pentru câini, pisici, păsări de colivie și voliera (canari, papagali porumbei voiajori și de ornament, nurci, dihori metronidazol, oxitetraciclina clorhidrat, furazolidonă.

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 comprimat conține:

Substanțe active

Metronidazol	50 mg/comprimat
Oxitetraciclina hidroclorică	30 mg/comprimat
Furazolidonă	10 mg/comprimat

4. INDICAȚII

Enteroguard M comprimate se utilizează pentru prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul enteropatiilor primare și secundare produse de bacterii sensibile la substanțele active și a infecțiilor cu protozoare flagelate, la câini, pisici, păsări de colivie și volier: (canari, papagali), porumbei voiajori și de ornament, nurci, dihori.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.
Nu se administrează la tineret sub vârsta de 4 săptămâni.
Nu se administrează la porumbeii destinați consumului uman.

6. REACȚII ADVERSE

Nu s-au constatat la dozele recomandate.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, păsări de colivie și voliera (canari, papagali), porumbei voiajori și de ornament, nurci, dihori

8. DOZE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Tratament curativ:

- La câini, pisici, nurci, dihori, produsul se utilizează ca atare sau sub formă de suspensie în apa de băut, după o prealabilă mărunțire, în doza de 1 comprimat/3 kg greutate corporală/zi, timp de 3 zile consecutive.
- La porumbei voiajori și de ornament, păsări de colivie și voliera, produsul se utilizează ca atare sau sub formă de suspensie, după o prealabilă mărunțire, în doza de 1/2 comprimat/1,25 kg greutate corporală/zi, respectiv 1/4 comprimat pentru 0,5 - 0,6 kg greutate corporală/zi, timp de 5 zile consecutive.

Preventiv (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat):

Produsul se administrează la jumătate din doza recomandată terapeutic.

În toate cazurile este recomandat ca tratamentele cu Enteroguard M comprimate să fie asociate cu administrarea de vitamine.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original.
A se păstra în loc uscat.
A se proteja de lumina.
A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Folosirea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.
Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingestie accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație și ouat

Utilizarea în perioada de gestație: a nu se utiliza în ultima parte a gestației.

Utilizarea în perioada de lactație: se va face pe baza evaluării balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar.

Utilizarea în perioada de ouat: nu este aplicabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Produsul nu trebuie administrat simultan cu antiacide pe baza de aluminiu sau cu preparate ce conțin Ca, Mg sau Fe, datorită apariției reacțiilor de chelatare cu tetraciclinele.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

Nu se asociază cu coccidiostaticele

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINA VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

14. DATA CÂND A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Mod de prezentare

Flacoane din polietilena de densitate înaltă x 20 comprimate /flacon, x 40 comprimate /flacon Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medical veterinar, vă rugăm să contact reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.