

Alamycin 10

Compoziție

Soluție injectabilă apoasă, stabilă, conținând clorhidrat de oxitetraciclină 100 mg/ml, plus sodiu formaldehid-sulfoxilat 0.15% w/v ca și antioxidant.

Indicații

Oxitetraciclina este activă față de o gamă largă de bacterii patogene Gram-pozitive și Gram-negative, anumite rickettsii și majoritatea virusilor. **Alamycin 10** este indicat pentru tratamentul și controlul unei game largi de afecțiuni generale sistemice, respiratorii, gastrointestinale, urinare și infecții locale, cauzate de sau în asociere cu microorganismele sensibile la tetraciclină.

Dozare și administrare

Prin injecții intramusculare sau lent intravenos.

Bovine: 1.5 – 4.0 mg/kg greutate corporală.

Porcine: 2.0 – 9.0 mg/kg greutate corporală.

Contraindicații, atenționări, etc

Deși s-au semnalat colapsuri la animalele slabe sau debilitate, toxicitatea generală este redusă.

Timp de așteptare

Laptele provenit de la vacile tratate nu trebuie dat în consumul uman și nici după aceea, timp de 84 ore. În timpul tratamentului, animalele nu trebuie sacrificate pentru consum uman. Animalele pot fi sacrificate pentru consum uman numai după 20 zile de la ultimul tratament.

Precauții farmaceutice

Depozitați la temperatura camerei, sub 25°C.

A se feri de lumină.

A se feri de accesul copiilor.

După extragerea primei doze, utilizați preparatul în maxim 28 zile. Aruncați produsul nefolosit.

După deschiderea flaconului, trebuie calculată data limită a utilizării produsului. În prospect este trecută data valabilității produsului după deschiderea sa. Această dată trebuie trecută pe spațiul gol de pe flacon.

Categoria legală

POM

Prezentare

Flacoane multidoze de 50 ml și 100 ml.

Alte informații

Nu sunt.

Producător

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, NEWRY, Co. Down, Irlanda de Nord.

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează pe bază de prescripție medicală.