

Nobilis[®] Ovo-Diphtherin

Vaccin viu, liofilizat contra (diftero) variolei aviare.

Descriere

Nobilis[®] Ovo-Diphtherin se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată, însoțit de un flacon cu diluant Unisolve și un dispozitiv de vaccinare cu două ace.

Compoziție

Fiecare doză conține minimum 3,7 log₁₀ EID₅₀ de virus variolic (Pox) aviar, tulpina WP cultivată pe embrioni SPF. Pastila liofilizată conține stabilizator și gentamicină sulfat.

Mod de acțiune

Vaccinul este preparat dintr-o tulpină capabilă să producă imunitate și o reacție locală vizibilă la 6-8 zile de la vaccinare.

Doze și mod de administrare

Cu ajutorul dispozitivului de vaccinare cu două ace se inoculează intradermic, în pliul aripei, câte o doză de virus-vaccin reconstituit cu diluantul Unisolve.

Prepararea soluției de vaccin:

- se deschide fiola cu vaccin liofilizat și flaconul cu diluant;
- prin intermediul racordului de plastic al flaconului cu diluant se dizolvă pastila liofilizată și se omogenizează.

Vaccinarea:

- se încarcă acele dispozitivului pentru vaccinare;
- se îndepărtează penele de pe partea internă a aripii și se introduc cele două ace simultan, intradermic ferindu-se mușchii, articulația sau vasele de sânge;
- se agită din când în când flaconul cu soluție vaccinală pentru omogenizare.

Controlul vaccinării:

La 6-8 zile de la vaccinare majoritatea păsărilor trebuie să prezinte 2-3 noduli la locul de inoculare. Absența acestora poate avea mai multe cauze:

- păsările sunt deja imunizate;
- nu s-a respectat tehnica de vaccinare;
- vaccinul a fost expus la căldură sau la soare;
- puii provin din părinți imunizați iar imunitatea lor este solidă.

Program de vaccinare:

Tineret de înlocuire și reproducție

Vaccinare în condiții obișnuite: în jurul vârstei de 10 săptămâni și după năpărlire

Vaccinarea de necesitate: la orice vârstă, se revaccinează înainte de intrarea în ouat și după năpărlire.

Broileri - vaccinarea de necesitate: la orice vârstă.

Programele de vaccinare vor fi alcătuite în funcție de situația epidemiologică.

Imunizare

Durata și intensitatea reacțiilor post-vaccinale ca și stabilirea imunității depind de starea de sănătate și întreținere a păsărilor. Imunitatea se instalează în 7 zile de la vaccinare, protecția obținută fiind de lungă durată.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave. Nu se vaccinează în perioada de ouat.

Efecte adverse

Nu sunt.

Incompatibilități și interacțiuni

Intervalul dintre două vaccinări succesive și diferite va fi de minimum 14 zile. Vaccinarea cu Nobilis[®] Ovo-Diphtherin poate fi efectuată concomitent cu cea împotriva encefalomielitei și anemiei.

Precauții

Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare. Un dispozitiv de vaccinare se va folosi la un număr mic de păsări și se va dezinfecta periodic.

Perioada de așteptare

Nu este cazul.

Supradozare

Dacă vaccinarea s-a făcut corect reacția locală este mai intensă.

Păstrare

La temperatura de 2-8° C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Cutie cu un flacon x 1000 dz. însoțit de un flacon cu diluant.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa în demâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.