

Nobilis[®] AE 1143

Vaccin viu, liofilizat, contra encefalomielitei infecțioase aviare.

Descriere

Nobilis[®] AE 1143 se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată de culoare albă.

Compoziție

Fiecare doză conține minimum 3,0 log₁₀ EID₅₀ din virusul encefalomielitei aviare, tulpina Calnek 1143. Pastila liofilizată conține stabilizator și gentamicină sulfat.

Indicații

Pentru imunizarea efectivelor de reproducție și a efectivelor de tineret de înlocuire, între 8 și 16 săptămâni. Vaccinarea ouătoarelor și reproducătorilor se va face cu cel puțin o lună înaintea începerii ouatului; astfel, se previne riscul transmiterii virusului pe verticală la puii proveniți din ouăle acestor păsări.

Doze și mod de administrare

Prin apa de băut sau prin instalații orale. Păsările trebuie să fie într-o stare perfectă de sănătate și de întreținere. Se va păstra un interval de 14 zile între două vaccinări consecutive cu vaccinuri diferite.

Vaccinarea prin apa de băut:

Se folosesc 1.000 doze la 20 - 30 litri de apă de fântână (lipsită de clor, metale și dezinfectante). Pentru reproducătorii grei sau / și în sezonul cald, cantitatea de apă va fi mai mare. Poate fi folosit lapte, în părți egale cu apa, pentru a proteja activitatea vaccinului. Soluția de vaccin (cu apă și lapte) va fi consumată în două ore. De aceea se vor instala adăpători suplimentare. Toate adăpătorile vor fi curate și fără urme de detergenți și dezinfectanți.

Imunizare

La o lună de la vaccinare, efectivul prezintă o imunitate suficientă pentru întreaga perioadă de ouat. Această imunitate se transmite pasiv progenilor. Toți puii rezultați din părinți vaccinați, sunt protejați în perioada critică.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave, păsările aflate în timpul perioadei de ouat și puii mai mici de două luni.

Efecte adverse

Durata și intensitatea reacțiilor postvaccinale depind de starea de sănătate și de întreținere a păsărilor.

Incompatibilități și interacțiuni

Nobilis[®] AE 1143 poate fi combinat și administrat împreună cu vaccinurile Nobilis CAV P4 și Nobilis Ovo-diphterin. Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe.

Precauții

Se va folosi instrumentar steril. Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8° C și la întuneric.

Prezentare

Flacon de 500 sau 1.000 doze.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.