

Stronghold® (selamectină)

Soluție pentru aplicare topică.

Mod de administrare

Câini și pisici: Pentru tratamentul și prevenția infestației cu purici, cauzate de *Ctenocephalides spp.*, protejând timp de o lună, după o unică administrare și ca parte a strategiei tratamentului dermatitei alergice față de purici. Pentru prevenția dirofilariozei cauzate de *Dirofilaria immitis* se vor face administrări lunare.

Câini: Pentru tratarea râiei sarcoptice (cauzată de *Sarcoptes scabie*), a celei auriculare (*Otodectes cynotis*) precum și a infestației cu viermi rotunzi (*Toxocara canis*).

Pisici: Pentru tratarea râiei auriculare (*Otodectes cynotis*), a viermilor intestinali rotunzi (*Toxocara cati*) precum și a lui *Ancylostoma tubaeforme*.

Dozaj

Câini:

< 2,5 kg	1 tub Stronghold 15 mg (vârf roz),
2,6 - 5 kg	1 tub Stronghold 30 mg (vârf violet),
5,1 - 10 kg	1 tub Stronghold 60 mg (vârf maro),
10,1 - 20 kg	1 tub Stronghold 120 mg (vârf roșu),
20,1 - 40 kg	1 tub Stronghold 240 mg (vârf verde),
> 40 kg	Cea mai bună combinație de tuburi.

Pisici:

< 2,5 kg	1 tub Stronghold 15 mg (vârf roz),
2,6 - 7,5 kg	1 tub Stronghold 45 mg (vârf albastru),
> 7,5 kg	Cea mai bună combinație de tuburi.

Pentru tratamentul și prevenirea infestației cu purici la câini și pisici, **STRONGHOLD** ar trebui administrat la intervale lunare pe toată durata sezonului de purici, începând cu o lună înainte ca puricii să devină activi.

Ca parte a strategiei tratamentului contra dermatitei alergice la purici, **STRONGHOLD** ar trebui administrat la intervale lunare.

Pentru a completa eliminarea râiei sarcoptice la câini, sunt necesare a se administra două doze consecutive, la interval de o lună. În cazul tratamentului râiei auriculare o singură administrare este de ajuns.

Pentru tratamentul râiei otodectice la pisici, administrarea unei singure doze este de ajuns.

Pentru tratamentul infestațiilor cu viermi intestinali rotunzi la câini și pisici, ca și în cazul prezenței *Ancylostoma* la pisici se va administra o singură doză de **STRONGHOLD**. Pentru prevenția dirofilariozei la câini și pisici, **STRONGHOLD** poate fi administrat pe toată durata anului, sau cel puțin cu o lună înainte ca animalul să fie expus țânțarilor și apoi lunar până la încheierea sezonului țânțarilor. Ultima doză trebuie administrată cu cel mult o lună înainte de ultima expunere la țânțari.

Mod de administrare

Se va scoate tubul de **STRONGHOLD** din pachetul său protector. Ținând tubul vertical, se va înlătura vârful tubului. Se face o cărare în părul animalului, la baza cefei, între omoplați, expunându-se o zonă redusă de piele. Se aplică vârful tubului de **STRONGHOLD** direct pe piele fără a se masa. Se golește tubul în totalitate prin presare fermă. A se evita contactul dintre **STRONGHOLD** și degete.

Contraindicații

Doar pentru uz veterinar. Pentru administrare externă. Acest produs se aplică doar pe suprafața pielii. A nu se administra pe cale orală sau parenterală. A nu se folosi la animale cu vârsta mai mică de 6 săptămâni.

A nu se aplica pe blana umedă. Cu toate acestea, spălarea cu șampon și/sau săpun a animalului la peste două ore după administrarea tratamentului nu va reduce eficacitatea **STRONGHOLD**.

A se ține animalele departe de foc sau alte surse de scânteii pentru cel puțin 30 de minute. A nu se permite animalelor tratate să intre în apă cel puțin două ore după tratament.

A se evita contactul direct cu animalele tratate până ce zona de aplicarea produsului este uscată. A se ține copiii departe de animalele tratate pentru cel puțin 30 de minute după aplicarea **STRONGHOLD** sau până ce zona în care s-a aplicat substanța este uscată. În cazul tratamentului râiei auriculare, nu se va aplica produsul direct în ureche.

După administrarea produsului, sau în cazul contactului dintre produs și piele se vor spăla mâinile cu săpun și apă. Dacă apare în mod accidental un contact cu ochii se vor clăti imediat cu apă și săpun și se va consulta un doctor.

Siguranța mediului

Selamectina poate afecta negativ peștii sau alte viețuitoare acvatice cu care aceștia se hrănesc. Tuburile utilizate și conținutul rezidual trebuie aruncate la gunoi, pentru a se evita contaminarea cursurilor de apă.

Condiții de păstrare

A nu se păstra la îndemâna copiilor. A nu se ține la temperaturi de peste 30°C. A se păstra împachetat, la loc uscat. Inflamabil - a se ține la distanță de foc, scânteii, flacăra sau alte surse de foc.

Mod de prezentare

O soluție transparentă spre gălbuie de selamectină. **STRONGHOLD** se prezintă sub formă de tuburi de plastic pentru administrare cutanată (spot - on) la câini și pisici.

Fiecare tub cu soluție spot - on conține:

STRONGHOLD 15 mg	0,25 ml (6%) selamectină,
STRONGHOLD 30 mg	0,25 ml (12%) selamectină,
STRONGHOLD 45 mg	0,75 ml (6%) selamectină,
STRONGHOLD 60 mg	0,25 ml (12%) selamectină,
STRONGHOLD 120 mg	1 ml (12%) selamectină,
STRONGHOLD 240 mg	2 ml (12%) selamectină.

fiecare prezentându-se ca trei tuburi de plastic într-un blister de aluminiu, acoperit cu carton.

Informații suplimentare

STRONGHOLD a fost administrat în doză de 10 ori mai mare decât cea recomandată fără să se observe apariția de efecte indesezirabile. **STRONGHOLD** a fost administrat în doză de 3 ori mai mare decât cea recomandată, la câini și pisici infestate cu *Dirofilaria* și nu au fost observate efecte indesezirabile. Produsul a fost administrat de 3 ori mai mult decât doza recomandată la masculii și la femelele de reproducție, pisici și căței, inclusiv la cățele gestante și lactante și la doze de 5 ori mai mari decât doza recomandată la rase gen Collie, cu sensibilitate la ivermectine și nu au fost observate efecte indesezirabile. În testele din teren nu au fost observate interacțiuni nedorite între **STRONGHOLD** și alte medicamente folosite uzual de către medicul veterinar pentru tratamente curente sau în cazul procedurilor chirurgicale.

Utilizarea **STRONGHOLD**-ului poate produce aglutinarea locală a părului, la locul de aplicare. În puține astfel de cazuri, apare o ușoară iritație locală, tranzitorie. Această cădere a părului și iritația tranzitorie se rezolvă de la sine în mod normal, dar o terapie simptomatică poate fi aplicată în anumite circumstanțe.

Rareori, **STRONGHOLD** poate produce aglutinarea locală a părului la locul de aplicație și/sau apariția unei mici cantități de pudră albă. Aceasta este normal și va dispărea în 24 de ore de la tratament și nu afectează siguranța sau eficacitatea **STRONGHOLD**. Este important să se aplice doza la locul corect, indicat, pentru a se minimiza cantitatea pe care animalul o poate linge de la locul de depunere. Dacă apare lingerea unei cantități importante de **STRONGHOLD**, o scurtă perioadă de hipersalivație poate fi întâlnită uneori la pisici.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !