

CEPRAVIN DRY COW 250 mg/seringa

suspensie pentru administrare intramamară la bovine

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

1. Schering-Plough Bray
Boghall Road
Co. Wicklow,
Irlanda

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

CEPRAVIN DRY COW 250 mg/seringa, suspensie pentru administrare intramamară la bovine
Cefalonium

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare seringă de 3 g conține:
Cefalonium (dihidrat de cefalonium) 250mg

INDICAȚII

Se recomanda in terapia vacilor in repaus mamar, în tratamentul infecțiilor subclinice existente și în prevenirea infecțiilor produse de microorganisme sensibile la cefalonium ce pot apărea în timpul repausului mamar

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează vacilor in lactație. Nu se administrează in cele 51 zile înainte de fătare.
Nu se administrează la animalele sensibile la cefalonium sau la alte antibiotice β lactamice sau la unul din excipienti.

REAȚII ADVERSE

Nu sunt





SPECII ȚINTĂ


Bovine

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrare intramamară un singur tratament la începutul perioadei de repaus.
Conținutul unei seringi trebuie administrat prin canalul mamar al fiecărui sfert imediat dupa ultima mulsoare din lactație.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

1.		Dupa mulsul complet se curata si se dezinfectează mamelonul (cu o compresa cu alcool metilic)
2(i)		Opțiunea 1: Pentru administrarea intramamară cu duza scurtă - Se tine seringă într-o mână, se trage dopul de protecție și încet se răsucesce partea scurtă superioară a capacului în sensul indicat (porțiunea de la baza dopului rămâne atașată la seringă). Aveți grijă să nu contaminați vârful seringii .
2(ii)		Opțiunea 2: Pentru administrare intramamară cu duză completă- Se îndepărtează dopul complet ținând seringă strâns în mână, iar cu degetul mare împingeți în sus și de-a lungul capacului până când se desprinde. Aveți grijă să nu contaminați duza seringii.
3.		Se introduce vârful seringii in canalul mamelonului si se apăsa pistonul pana când toata doza a fost introdusa. Se tine mamelonul cu o mână si se masează sfertul ușor de jos în sus pentru dispersia antibioticului.

4.		La final se introduce mamelonul in soluția dezinfectantă.
----	---	---

TIMP DE AȘTEPTARE

Laptele pentru consumul uman se poate folosi la 96 ore de la fătare.

Daca fătarea survine înainte de 54 de zile de la tratament, laptele trebuie dat pentru consum uman după 54 zile și 96 de ore după tratament, asigurându-ne astfel ca laptele de la ultimele 7 mulsori este eliminat.

Absenta antibioticului ar trebui să fie confirmată prin testare înainte ca laptele să fie dat pentru consum uman. Pentru vacile cu hipocalcemie este nevoie să se arunce laptele o perioadă mai lungă de timp.

Daca produsul este folosit la juninci, aceleași precauții ar trebui să fie luate ca și în cazul vacilor, administrarea intramamară nu trebuie făcută în mai puțin de 54 de zile înainte de fătare și laptele trebuie aruncat conform legii, 4 zile după fătare.

Animalele pentru consum uman trebuie abatorizate după 21 zile de la ultimul tratament.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 30°C.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Numai de uz veterinar.

O singură seringă trebuie folosită o singură dată. Seringile parțial folosite se arunca.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Produsul va fi utilizat pe baza testării sensibilității antimicrobiene și se va lua în considerare legislația locală cu privire la folosirea substanțelor antimicrobiene. Folosirea incorectă poate crește prevalența rezistenței bacteriilor la cefalonium și poate scădea eficacitatea tratamentului cu cefalosporine, ca urmare a rezistenței încrucișate.

A nu se contamina sau îndoi duza seringii

Mastitele de vară- este puțin probabil ca tratamentul unic cu acest antibiotic să controleze singur mastitele de vară și de aceea alte măsuri ar trebui să fie implementate ca parte a tratamentului de rutină. Aceste măsuri includ:

- un control al eradicării muștelor în ferma
- A se evita pășunatul vacilor pe terenuri ude sau împădurite, care sunt cunoscute ca fiind asociate cu mastitele de vară
- introducerea mameloanelor în soluția dezinfectantă la vaci și juninci după administrarea intramamară profilactică
- atenție deosebită pentru mameloanele cu leziuni care atrag rapid muștele
- femelele cu aceasta problemă nerezolvată, ar trebui să schimbe modul de fătare pentru a evita riscul apariției bolii la animale în timpul verii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Spălați mâinile după utilizare.

Penicilina și cefalosporinele pot cauza sensibilizare după injectare, inhalare, ingestie sau contact cu pielea. Sensibilitatea la penicilina poate determina sensibilitate încrucișată la cefalosporină și invers. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi destul de grave.

Nu folosiți acest produs dacă sunteți alergic, sau dacă ați fost anunțați să nu lucrați cu asemenea preparate.

Mânuiți produsul cu mare grijă pentru evitarea expunerii, ținând cont de toate precauțiile recomandate.

Daca apar simptome după expunere cum sunt erupții cutanate, cereți imediat sfatul medicului și prezentați medicului aceste precauții. Inflamarea feței, a buzelor și ochilor sau dificultate în respirație sunt simptome mai grave ce necesită consult medical de urgență.

Se folosește în ultimul trimestru al gestației, după ce vaca intră în repaus mamar.

Nu are efecte adverse asupra fătului.

Nu trebuie utilizat la vacile în lactație.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

ALTE INFORMAȚII

Cutii cu 20 seringi; pachete mari cu 120 seringi (6 cutii de 20 seringi),.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate