

# Oxyvet<sup>®</sup> 20% inj. L.A.

**Compoziție**

1 ml conține:

**Substanță activă**

Oxitetraciclină bază (sub formă de dihidrat) 200 mg

**Indicații**

OXYVET<sup>®</sup> soluție injectabilă 20% (L.A.) retard este indicat în tratamentul și combaterea a numeroase afecțiuni sistemice, gastrointestinale, respiratorii și infecții locale determinate de microorganisme sensibile la oxitetraciclină.

*Bovine:* actinobaciloză, necrobaciloza ongoanelor și cea interdigitală, pneumonii, pasteureloză, mastită, metrită, colibaciloză și infecții puerperale.

*Porcine:* în tratamentul rujetului al sindromului metrită-mamită-agalaxie, infecții secundare consecutive pneumoniei enzootice.

*Ovine, caprine:* tratamentul infecțiilor puerperale, mastită, pneumonii.

**Contraindicații**

Nu se recomandă în tratamentul câinilor, pisicilor și cabalinelor.

Nu se recomandă în cazurile cunoscute cu hipersensibilitate la tetraciclină, precum și în cazul animalelor cu insuficiență renală sau hepatică.

**Reacții adverse**

Administrarea tetraciclinei în timpul perioadei de osteogeneză poate determina îngălbenirea dinților. Diversele reacții locale și dureri la locul injectării au caracter tranzitoriu.

Dacă se observă orice alt efect nemenționat în acest prospect vă rugăm informați medicul veterinar.

**Specii țintă**

Bovine, ovine, caprine, suine.

**Doze recomandate pentru fiecare specie în parte, căi de administrare și mod de administrare**

OXYVET<sup>®</sup> soluție injectabilă 20% retard se administrează prin injecții intramusculare profunde în doză de 20 mg oxitetraciclină per kg greutate vie care este echivalent cu 1 ml OXYVET<sup>®</sup> soluție injectabilă 20% retard per 10 kg g.v.

Volumele administrate prin injectare în același loc nu vor depăși:

Bovine	20 ml
Ovine, caprine	5 ml
Porcine	10 ml.

În urma administrării de OXYVET<sup>®</sup> soluție injectabilă 20% retard nivelul în sânge este prelungit, astfel că un singur tratament este de obicei suficient. În cazul unor boli grave aceeași cantitate poate fi repetată la intervale de 3 zile.

**Recomandări privind administrarea corectă**

Administrați produsul utilizând proceduri sterile.

Acest produs nu trebuie utilizat pentru profilaxie.

**Timp de așteptare**

*Carne:* 28 zile.

*Lapte:* 7 zile.

**Precauții speciale pentru depozitare**

A se păstra în loc uscat și rece.

A se proteja de lumină.

**Atenționare specială**

Nu este cazul.

**Precauții speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deșeurilor**

Întrebați medicul dumneavoastră veterinar cum să îndepărtați produsele medicinale neutilizate. Aceste măsuri pot ajuta la protecția mediului.

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

**A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.**

**Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.**

**Producător**

VETERIN S.A

19300 Aspropyrgos P.O BOX 26, Atena

TEL: +30 210 5575770, FAX: +30 210 5575830