

## Amoxicilina 22.5% + Flumechina 15%

**Pulbere solubilă pentru administrare orală pentru porci, broileri și curcani.**

**Compoziția:**

- Trihidrat de amoxicilină 258.2 mg,  
(egal cu 22.50 g amoxicilină)
- Flumequina 150.0 mg.

**Excipienți:**

- excipienți solubili 1.0 g.

**Indicații:**

Combinăția de amoxicilina și flumequină este recomandată la cele trei specii țintă în tratamentul bolilor bacteriene determinate de microorganisme sensibile la cele două principii active:

**Porci:**

- infecții ale tractului respirator (bronșită, bronhopneumonie, pneumonie, pleurezie disfuncții pulmonare asociate cu infecții virale);
- infecții ale tractului gastroenteric (enterită, colangiohepatită);
- infecții urinare (nefrite, cistite);
- infecții ale pielii și țesuturilor moi (infecții podale și abcese);
- infecții articulare (poliartrită);
- infecții streptococice;
- colibaciloză, salmoneloză și pasteureloză.

**Broileri și curcani:** produsul se administrează în tratamentul:

- Salmonelozei;
- Colibacilozei;
- Infecțiilor Stafilococice;
- Pasteurelozei;
- Infecții bacteriene secundare infecțiilor virale (C.D.R.).

**Contraindicații:**

A nu se administra la animale care sunt hipersensibile la peniciline: iepuri, rozătoare mici, animale poligastrice cu rumen funcționabil și găini ouătoare. A nu se asocia cu tratamente cu sulfonamide și trimetoprim sistemic.

**Reacții adverse:**

Disfuncții gastrointestinale și reacții de sensibilitate, variind între urticarii ușoare și șocuri anafilactice fatale. Pot apărea alergii încrucișate la toate celelalte peniciline.

**Specii țintă:**

Porci, broileri și curcani.

**Posologie pentru fiecare specie, căi de administrare și mod de administrare:**

**Porci, broileri și curcani:** 8 g de **Amoxicilina 22.5% + Flumechina 15%** la fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 18mg amoxicilină și 12 mg de flumequină per greutate corporală).

A se utiliza după cum urmează: **broileri** 40 – 80 g în 100 litri apă, **curcani** 40 – 160 g în 100 litri apă, **porci** 55 – 160 g în 100 litri apă sau 110 – 320 g în 100 kg hrană lichidă.

Produsul trebuie administrat în apă de băut sau hrană lichidă conform instrucțiunilor medicului veterinar. A se avea grijă a nu se depăși doza zilnică de principii active permise (exprimati în mg/kg greutate corporală).

Concentrația în apa de băut trebuie calculată conform greutății corporale a animalului și conform consumului de apă. Se recomandă a nu se da apă animalelor în orele imediat anterioare tratamentului.

Durata tratamentului este de 5 zile .

**Recomandări privind administrarea corectă:**

Produsul se administrează oral dizolvat corespunzător în apa de băut sau hrana lichidă.

**Timp de așteptare:**

- Porci:** 5 zile;
- Broileri:** 3 zile;
- Curcani:** 3 zile.

**Precauții speciale pentru depozitare:**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C .Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni. Perioada de valabilitate a soluției gata preparată este de: 12 ore.

**Atenționări speciale:**

A nu se amesteca produsul în hrana solidă.

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă: a nu se administra la găini ouătoare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: la manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal.

Utilizarea în perioada de gestație și lactație: nu a fost observat vreun efect serios.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune: administrarea simultană a amoxicilinei cu antibiotice bacteriostatice ca tetraciclinele și macrolidele, trebuie evitată, pe măsură ce activitatea antibacteriană a amoxicilinei este redusă. Sinergismul acțiunii apare când amoxicilina este administrată împreună cu cloxacilina, polimixine (colistin) și aminoglicozide (streptomcina, neomicina, gentamicina și

kanamicina ). Rezistența încrucișată cu penicilinele se dezvoltă repede, în special cu ampicilina. Combinația cu acid clavulanic cauzează acțiune intensificată. Administrarea flumequinei nu este compatibilă cu cea a sulfonamidelor și trimetoprimului. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz: a nu se depăși doza recomandată. Incompatibilități: vezi contraindicațiile și interacțiunile.

**Ambalaj:**

- plic de 100 g.
- saci de 1kg și 5 kg.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !