

Neocidol 600 EC

concentrat ad. us. vet.

Compoziție

Diazinon 600 g/litru (O,O dietil O-2 izopropil-6-metilpirimidin-4-il) fosforotioat.

Forma farmaceutică

Soluție pentru îmbăiere.

Prezentare

Ambalaje din plastic conținând 1 litru produs.

Specii țintă

Ovine, bovine, porcine.

Indicații

Combaterea ectoparaziților (căpușe, pureci, muște, râie și păduchi).

Dozare, mod de utilizare

Momentul și frecvența tratamentului depinde de tipul parazitului, de factorii de mediu și de gradul de infestare. Efectivele infestate cu râie sau suspecte de infestare, trebuie îmbăiate de două ori la un interval de 7 – 10 zile. Concomitent trebuie efectuată aspersarea, respectiv spălarea cu **Neocidol 600 EC** a adăposturilor (a grajdului, a țarcurilor) precum și a instalațiilor respective.

Modalitate, specie	Concentrația
ASERSARE <i>Animale domestice</i> <i>Porcine</i>	600 ppm (20 ml Neocidol/20 litri) 250 ppm (10 ml Neocidol/24 litri)
IMBAIERE <i>ovine</i> concentrație de pornire completare	250 ppm (1000 ml Neocidol/2400 litri) 750 ppm (1250 ml Neocidol/1000 litri)
<i>bovine</i> concentrație de pornire completare	600 ppm (1000 ml Neocidol/1000 litri) 1500 ppm (2500 ml Neocidol/1000 litri)
TRATAREA ADĂPOSTURILOR 5 litri pentru aspersare/100 m ²	2, 5% (200 ml Neocidol/5 litri)

Animalele trebuie imersate în totalitate cel puțin odată în soluție. Îmbăierea oilor nu trebuie efectuată cu mai puțin de 2 săptămâni imediat după tundere. Soluția preparată trebuie utilizată în decurs de 24 ore.

Atenționare: Produs inflamabil!

A se feri de contactul cu pielea și ochii! În timpul lucrului, se va utiliza îmbrăcăminte de protecție, mască, bască, cizme de cauciuc. Înainte de servirea mesei, a băutului sau a fumatului, se va efectua spălarea riguroasă a mâinilor! Citiți prospectul înainte de utilizare ! A nu se lăsa la îndemâna copiilor !

Producător

Zagro Europa GmbH, Rheinstrasse 1, Rheinfelden D 79618, Germania.

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează pe bază de prescripție medicală.