

SULFA-TRIMO PLUS pulvis

Compoziția:

- Sulfachlorpyridazine 100,00 mg,
- Trimethoprim 20,00 mg,
- excipient până la 1,00 gr.

Indicații:

Pentru tratamentul infecțiilor cauzate sau complicate de germeni sensibili la sulfonamide.

Bovine: bronhopneumonia, diareea, gastroenterite, colisepticemia, omphalitis, diphteria viteilor.

Porcine: bronhopneumonia, pneumonia enzootica, diareea, colibaciloza, sindromul MMA, colienterotoxiemia, pasteureloza, rinita atrofică.

Păsări: CRD, colibaciloza, coriza infecțioasă, holera, salpingitis, pasteureloza, salmoneloza, staphylococcidioza.

Atenție:

Nu este indicată în perioada de ouat.

Mod de administrare:

Viței: 5 – 7 gr **SULFA-TRIMO PLUS** / 50 kg m.c. în laptele furajer, administrat jumătate din cantitate dimineața și cealaltă jumătate seara, timp de 5 – 10 zile.

Porcine: 1,0 – 3,5 gr **SULFA-TRIMO PLUS** / 1 litru de apă potabilă sau 3 – 7,0 kg / tonă furaj. Tratamentul se va repeta timp de 6 – 10 zile.

Păsări: 1 – 1,5 gr **SULFA-TRIMO PLUS** / 1 litru apă de băut sau 1,5 – 2,5 kg / tonă furaj, timp de 3 – 6 zile consecutiv.

Tratamentul trebuie continuat până la 2 – 3 zile după dispariția simptomelor.

A nu se administra mai mult de termenul recomandat.

Apa mendicamentată trebuie să fie singura sursă de apă pentru animalele tratate.

Supradozaj:

Disfuncții renale, disfuncții sangvine, reacții cutanate pot apărea în caz de supradozare. În cazul în care apar efecte secundare, trebuie întrerupt tratamentul și trebuie administrat tratament simptomatic.

Timp de așteptare:

Țesuturi comestibile:

păsări și porcine - 4 zile,

viței – 7 zile.

Păstrare:

A se păstra în loc răcoros, ferit de lumină. A se feri de îndemâna copiilor.

Valabilitate:

În ambalajul închis, original, 24 de luni de la data fabricației.

Producător:

PHARMATEKA BT - Ungaria.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !