

Ronaxan

100 mg, comprimate pentru câini

Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și a deținătorului autorizației de fabricare, responsabil pentru eliberarea seriilor de produs, dacă sunt diferite

Deținătorul autorizației de comercializare: Merial, 29 Avenue Tony Garnier, FR-69007 LYON, Franța.

Producător responsabil pentru eliberarea seriei: Merial, 4 Chemin du Calquet, FR-31300 Toulouse, Franța.

Denumirea produsului medicinal veterinar

Ronaxan 100 mg comprimate pentru câini.

Doxiciclină.

Declararea substanței active și a altor ingrediente

Fiecare comprimat conține:

Doxiciclină (doxiciclină hidrat)	100 mg
Excipient q.s.	500 mg

Indicații

Tratamentul infecțiilor acute și subacute, cauzate de microorganisme sensibile la doxiciclină:

- afecțiuni respiratorii (rinite, tonsilite, bronhopneumonii, boli respiratorii la feline)
- infecții ale pielii (dermatite supurative și abcese)
- infecții ale tractului urinar (cistite și prostatite)
- infecții ale aparatului reproducător (metrite)

Tratamentul prelungit este de obicei eficient și în formele cronice ale bolilor de mai sus.

Contraindicații

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Reacții adverse

În terapia cu tetraciclină au fost raportate reacții adverse precum vomă, esofagită și diaree. Produsul nu trebuie administrat animalelor cu disfație sau alte boli însoțite de vomă.

Specii țintă

Câini.

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

Dozare: 10 mg de doxiciclină pe kg greutate corporală zilnic, doză zilnică unică, împreună cu hrana, timp de 3 până la 5 zile pentru afecțiunile acute și subacute și timp de 10 zile pentru afecțiunile cronice.

Calea de administrare: orală

Pentru pisici și câini de talie mică:

- 1 comprimat de Ronaxan 20 mg pe 2 kg greutate corporală zilnic.

Pentru câini de talie mare:

- 1 comprimat de Ronaxan 100 mg pe 10 kg greutate corporală zilnic
- 1 comprimat de Ronaxan 250 mg pe 25 kg greutate corporală zilnic.

Recomandări privind administrarea corectă

A se administra de preferat cu hrana.

Timp de așteptare

Nu se aplică.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Atenționare specială

Numai pentru uz veterinar.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.