

Noroclav tbl.

Compoziția:

Noroclav tbl. este destinat administrării orale la câini, în două dozări, astfel: 50 mg și 250 mg.

Fiecare tabletă **Noroclav tbl.** de 50 mg conține:

- Amoxicilină (sub formă de trihidrat de amoxicilină Ph.Eur.) 40 mg,
- Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu Ph.Eur.) 10 mg.

Fiecare tableta de **Noroclav tbl.** de 250 mg conține:

- Amoxicilină (sub formă de trihidrat de amoxicilină Ph.Eur.) 200 mg,
- Acid clavulanic (sub formă de clavulanat de potasiu Ph.Eur.) 50 mg.

Indicații:

Noroclav tbl. are un spectru larg de acțiune bactericidă împotriva celor mai frecvente bacterii care se întâlnesc la câini.

(i) In vitro, amoxicilina potențată este activă împotriva unei game variate de bacterii aerobe și anaerobe importante clinic, incluzând:

Gram – pozitive:

- *Stafilococi* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamază),
- *Clostridii*; *Corynebacterii*,
- *Peptostreptococcus spp.*,
- *Streptococi*;

Gram – negative:

- *Bacteroides spp.* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamază),
- *Escherichia coli* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamază),
- *Salmonellae* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamază),
- *Bordetella bronchiseptică*,
- *Campylobacter spp.*,
- *Fusobacterium necrophorum*,
- *Klebsiellae*, *Pasteurellae*,
- *Proteus spp.*

(ii) Clinic, tabletele Noroclav sunt eficiente în tratarea unui număr mare de boli ale câinilor incluzând: boli ale pielii (inclusiv piodermitele superficiale sau profunde); infecții ale țesuturilor moi (abcese și proctite); infecții dentare (gingivite); infecții ale tractului urinar; boli respiratorii (incluzând tractul respirator superior și inferior); enterite.

Dozarea și mod de administrare:

Administrarea: pe cale orală. Tabletele pot fi sparte și administrate cu o cantitate mică de alimente.

Dozarea: 12,5 mg/ kg greutate corporală. Doza recomandată de 12,5 mg/kg este echivalentul unei tablete per 4 kg greutate corporală. Pentru majoritatea infecțiilor, inclusiv pentru cele cutanate, al celor urinare și gastro-intestinale, dozarea de mai sus este eficientă. Cazurile refractare, mai ales cele ale tractului respirator necesită dublarea dozei la 25 mg/ kg greutate corporală, de două ori pe zi. (De reținut că cel mai mic animal în greutate de 1 kg a primit o jumătate de tabletă de 50 mg, deci a primit deja doza dublă de 25 mg/ kg.).

Durata tratamentului: cazurile de rutină cuprind toate indicațiile.

Majoritatea cazurilor răspund la un tratament de 5 – 7 zile.

Cazurile cronice sau refractare: în cazurile cu distrugerii tisulare considerabile poate fi necesară o perioadă mai mare de tratament pentru a se ameliora distrugerile celulare. Bazându-ne pe observațiile clinice, următoarele perioade sunt necesare ca și orientare:

Boli de piele cronice: 10 – 20 zile,
Cistite cronice: 10 – 28 zile,
Boli respiratorii: 8 – 10 zile.

Contraindicații, atenționări etc.:

Numai pentru uz veterinar. Noroclav tablete nu trebuie administrat iepurilor, porcilor de guineea, hamsterilor. Se va avea grijă în administrarea la alte ierbivore mici.

Atenționări pentru operator:

Penicilinele și cefalosporinele pot provoca hipersensibilitate (alergie) consecutiv injectării, ingerării sau în contact cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate conduce la reacție încrucișată cu cefalosporinele și vice versa. Reacțiile alergice la aceste produse pot fi uneori foarte grave.

Nu utilizați acest produs dacă știți că sunteți sensibil sau ați fost sfătuit să nu utilizați aceste produse.

Manipulați cu atenție produsul pentru a preveni expunerile, luând toate măsurile de precauție.

Dacă observați semne consecutiv expunerii cum ar fi iritații ale pielii trebuie să apelați la medic prezentând atenționarea de față.

Umflarea feței, a buzelor, a ochilor sau dificultăți în respirație sunt simptome mai grave și necesită asistență medicală de urgență.

Precauții farmaceutice:

Nu depozitați la temperatura de peste 25°C. Depozitați într-un spațiu uscat. A se feri de accesul copiilor. Nu depozitați produsul nefolosit în gunoiul menajer.

Alte informații:

Rezistența la multe antibiotice este determinată de enzima beta-lactamază care distruge antibioticul înainte de a-și manifesta efectul antimicrobian. Acidul clavulanic din **Noroclav Tbl.** contracarează acest mecanism de apărare bacterian prin inactivarea beta-lactamazei, expunând sensibilitatea microorganismului la efectul rapid bactericid al amoxicilinei, la concentrații rapid obținute în organism.

Noroclav tbl. este eficient pentru infecțiile cu Klebsiella, dar nu are eficacitate în cazurile determinate de Pseudomonas.

Deșeurile:

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare:

Tablete Noroclav a 50 mg:

- tuburi a 100 și 500 tablete,
- ambalaje a 2, 10 și 50 blistere conținând 10 (50 mg) tablete per folie.

Tablete Noroclav a 250 mg:

- tuburi a 100 și 250 tablete,
- ambalaje a 4, 10 și 50 blistere conținând 5 (250 mg) tablete per folie.

Valabilitate:

1 an și 6 luni.

Producător:

Norbroom Laboratories Limited, Station Works, NEWRY, Co. Down, Irlanda de Nord.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !