

Fiproline

50 mg soluție spot-on pentru pisici

Deținătorul autorizației de comercializare:

ALFAMED, 13ème Rue – L.I.D., 06517 CARROS CEDEX, Franța.

Declararea substanței active și a altor ingrediente

Fiecare pipetă de 0,5 ml conține:

Substanța activă:

Fipronil 50 mg

Excipienți:

Butilhidroxianisol E320 0,1 mg

Butilhidroxitoluen E321 0.05 mg

Indicații

Tratamentul infestației cu purici (*Ctenocephalides* spp.) și căpușe (*Demecentor reticulatus*).

Produsul are o eficiență insecticidă persistentă timp de 5 săptămâni (*Ctenocephalides felis*).

Produsul are o eficacitate acaricidă persistentă până la 2 săptămâni împotriva căpușelor (*Rhiphicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Dacă deja sunt prezente anumite specii de căpușe (*Rhiphicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) atunci când se aplică produsul, se poate ca nu toate căpușele să fie omorâte în primele 48 de ore, dar ele vor fi omorâte într-o săptămână.

Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice produse de purici, atunci când aceasta a fost diagnosticată anterior de un medic veterinar.

Contraindicații

În absența informațiilor disponibile nu se utilizează la pisici cu vârsta mai mică de 2 luni și/sau care cântăresc mai puțin de 1 kg.

Nu se utilizează la animale bolnave (de ex. boli sistemice, stări febrile...) sau la animale în convalescență.

Nu se utilizează la iepuri, deoarece ar putea apare reacții adverse sau chiar decesul.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Reacții adverse

Dacă animalul linge zona aplicării, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivație, în principal datorită naturii solventului.

Printre efectele adverse extrem de rare raportate după folosirea produsului se numără reacții cutanate trecătoare la locul aplicării (decolorare cutanată, alopecie locală, prurit, eritem) și prurit generalizat sau alopecie. În mod excepțional, au fost raportate după aplicare hipersalivație, simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, simptome nervoase), vomă sau simptome respiratorii.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Pisici.

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

Calea de administrare și cantitatea de administrat:

Doar pentru uz extern.


Se administrează prin aplicare locală pe piele 1 pipetă de 0,5 ml pentru fiecare animal.

Mod de administrare

Țineți pipeta în poziție verticală. Bateți ușor capătul îngust al pipetei pentru a vă asigura că tot conținutul este în corpul pipetei. Rupeți capătul pre-decupat al pipetei spot-on de-a lungul liniei marcate.

Faceți o cărare în blana animalului, până ce pielea devine vizibilă. Aplicați vârful pipetei pe pielea expusă și apăsați ușor de câteva ori, pentru a goli conținutul.

Repetăți procedura în unu sau două puncte diferite de-a lungul spatelui pisicii, preferabil la baza capului sau între umeri.



(Notă: forma pipetelor comercializate poate fi diferită, ca și imaginile de pe cutii/din prospecte.)

Este important să vă asigurați că doza este aplicată într-o zonă unde animalul nu poate să lingă produsul și să ne asigurăm că animalele nu se ling unele pe celelalte după tratament.

Se va avea grijă ca blana să nu fie umezită cu produsul în mod excesiv, deoarece acest lucru poate cauza un aspect lipicios al blănii la locul de aplicare a tratamentului. În cazul în care acest lucru se întâmplă, va dispărea în decurs de 24 de ore după aplicare.

Pot fi observate, de asemenea, depozite albe timp de până la 48 de ore de la aplicare.

Notă: Vor fi 2 prospecte, câte unul pentru fiecare tip de pipetă. În orice caz, din motive practice, ambele sunt descrise pe 1 prospect.

Recomandări privind administrarea corectă

Schema de tratament

Pentru combaterea optimă a infestației cu purici și/sau căpușe, schema de tratament se va baza pe situația epidemiologică locală.

În absența studiilor de siguranță, intervalul minim dintre tratamente este de 4 săptămâni.

Timp de așteptare

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 30 °C. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul original.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe pipetă.

Atenționări speciale

Puricii de pe animalele de companie infestază de cele mai multe ori și coșul animalului, locul în care se culcă și zonele în care stă de obicei, cum ar fi covoarele și obiectele moi de mobilier, care trebuie tratate, în cazul infestațiilor masive și la începutul măsurilor de combatere, cu un insecticid adecvat și aspirate regulat.

Produsul nu previne atașarea a căpușelor de animale. **Dacă animalul a fost tratat înaintea expunerii la căpușe**, căpușele vor fi omorâte în primele 24 – 48 de ore de la atașare. Aceasta se va întâmpla de obicei înainte de ajungerea căpușei la sațietate, reducând la minim, dar neexcluzând, riscul transmiterii bolilor. Odată omorâtă, căpușa cade, de cele mai multe ori, de pe animal, iar cele rămase pot fi îndepărtate trăgând ușor de ele.

Nu sunt disponibile date privind efectele îmbăierii/șamponării asupra eficacității produsului la pisici. Totuși, pe baza datelor disponibile pentru câini, șamponarea cu o oră înainte de tratament nu afectează eficacitatea produsului împotriva puricilor.

Când este utilizat ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice produse de purici, se recomandă aplicări lunare la pacienții

alergici și la celelalte pisici din locuință.

Pentru combaterea optimă a infestării cu purici într-o casă cu mai multe animale de companie, toți câinii și toate pisicile din casă trebuie tratate cu un insecticid adecvat.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Evitați contactul produsului cu ochii animalului. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți imediat și abundent cu apă.

Nu aplicați produsul pe pielea care prezintă răni sau leziuni.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Acest produs este iritant pentru ochi și mucoase. De aceea, contactul acestui produs cu ochii sau gura trebuie evitat.

În caz de contact accidental cu ochii, se vor clăti imediat și abundent cu apă. Dacă persistă iritația oculară cereți sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului.

Nu fumați și nu consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării produsului.

Evitați contactul conținutului cu degetele. Dacă acest lucru se întâmplă, spălați mâinile cu apă și săpun. Spălați-vă pe mâini după folosire.

Animalele și persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau excipienți ar trebui să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Animalele tratate nu trebuie atinse și copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până după uscarea locului de aplicare. De aceea, se recomandă ca animalele să nu fie tratate pe timpul zilei, ci seara devreme, iar animalelor recent tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii acestora în special cu copiii.

Alte precauții

Datorită alcoolului conținut, produsul poate avea efecte nedorite asupra suprafețelor vopsite, lăcuite sau a altor suprafețe din casă sau ale mobilierului.

Utilizare în perioada de gestație sau lactație

Studiile de laborator cu fipronil nu au evidențiat nici un efecte teratogen sau embriotoxic.

Nu au fost efectuate studii cu acest produs la pisici gestante sau aflate în lactație. În timpul gestației sau lactației produsul se utilizează numai conform evaluării balanței beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Fipronil poate fi dăunător pentru organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul acestuia.

Date în baza cărora a fost aprobat ultima dată prospectul

01.2013

Alte informații

Dimensiunile ambalajelor: cutii cu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 sau 150 pipete.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Distribuit de

Maravet SRL, Str. Maravet nr. 1, Baia Mare, România.