

Iodofoam Endofoam A.U.V 45,2g

Bovine

1. COMPOZIȚIE

- iod 0,2 g
- iodura de calciu 0,4g -gaz pentru compresie

2. INDICAȚII

La bovine în caz de endometrite de gradul I și II.

3. CONTRAINDICAȚII

A nu se folosi în caz de hipersensibilitate la substanța activă.

4. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

5. DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

În cele mai multe cazuri o singură administrare este de ajuns, dacă este necesar tratamentul se poate repeta de două trei ori la interval de o săptămână. Cateterul instalat la capătul tubului se introduce în uter. Prin introducerea unei mâini trans-rectal fixăm cervixul iar cu cealaltă mână introducem cateterul în uter. Dacă tubul este foarte rece se încălzește până la temperatura corpului. A nu se folosi apă fierbinte pentru încălzirea tubului.

6. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne: 0 zile Lapte: 0 zile

7. DEPOZITARE

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui, se păstrează la temperaturi între 5 - 25 C°. A nu se congela sau refrigera. A nu se perfora sau arde nici măcar după utilizare. Nu pulverizați produsul pe o flacăra deschisă sau pe un material incandescent. A se feri de sursele de aprindere.

8. PRECAUȚII SPECIALE

Orice produs neutilizat sau deșeu se va elimina în conformitate cu cerințele locale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Numai pentru uz veterinar.

9. PRODUCĂTOR

Pernix Pharma Kft. 8900 Zalaegerszeg, Biro M. U. 38