

Osteocicatrat GEL

adjuvant osteoreparator, antiinflamator și rubefiant

1. COMPOZIȚIE pentru 100 g

100 g Osteocicatrat Gel conțin:

Extract de *Symphytum officinale* (tătăneasă) 25 g

Extract de *Chelidonium majus* (rostopască) 25 g

Excipienți (mentol; camfor; natrosol, nipagin, glicerină, propilenglicol, hidroxid de sodiu, apă deionizată) ad 100 g.

2. ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ

Tătăneasă, prin componenta sa de bază – alantoina, are proprietăți cicatrizante, emoliente, antiiritative și keratolitice. Alantoina este un agent non-toxic, fiind utilizată cu succes în produse dermatologice, cosmetice și veterinare; stimulează proliferarea celulară și formarea de țesut nou, sănătos; are un efect keratolitic pronunțat și o puternică acțiune emolientă, acționând ca un agent chimic de îndepărtare a debrisurilor celulare necrozate și de curățare a locului de aplicare. Efectul alantoinii se manifestă și la concentrații scăzute (0,1 – 2 %).

Rostopasca are ca și componentă de bază chelidonina – un benzofenantridin derivat cu acțiune similară cu cea a morfinei. Are efect sedativ, analgezic, spasmolitic și citostatic.

Camforul și mentolul au un efect ușor rubefiant și de răcorire a zonei de aplicare.

Compoziția excipientului (baza de gel) asigură o penetrare eficientă a produsului în piele, permițând manifestarea rapidă a acțiunii acestuia.

3. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici

4. INDICAȚII

Este recomandat ca adjuvant în:

- afecțiuni articulare: entorse, luxații, dureri articulare, reumatism articular
- fracturi (acelerează formarea calusului osos)
- reducerea exostozelelor
- lactația falsă la cățea (produsul se aplică pe lanțul mamar până la remiterea afecțiunii).

5. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

7. MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se va administra local, prin aplicarea în strat subțire și masarea ușoară a zonei, pentru a permite gelului să pătrundă rapid în piele.

Produsul se aplică de 2 – 3 ori pe zi, timp de 4 – 5 zile.

Administrarea produsului se poate prelungi până la 14 zile în afecțiunile grave, fără riscul producerii unor complicații secundare.

8. ATENȚIONĂRI

Nu se aplică decât pe pielea intactă, în strat subțire.

În cazul exostozei, se recomandă ca zona să fie în permanență acoperită cu un strat subțire de produs.

Se va evita contactul produsului cu ochii animalului și ai omului.

9. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

10. MOD DE PREZENTARE

Tuburi cu 30 g sau 50 g de gel.