

Coliprim 2400 Pulvis

COMPOZIȚIE

- Colistin (*sub forma de sulfat*) 2 400 000 UI / g
- Excipienți q.s. pana la 1 000,0 mg

FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluție de uz oral sau furaj medicamentat.

DESCRIERE

COLIPRIM 2400 Pulvis este o formulă hidrosolubilă ce conține colistin sulfat ca substanță activă.

Colistin este un antibiotic polipeptidic cu acțiune bactericidă rapidă. Este un agent de suprafață activ, cationic, ce distruge structura fosfolipidică a membranei celulare și crește permeabilitatea celulei printr-un efect asemănător detergenților. Este foarte activ împotriva multor specii de microorganisme Gram-negative, cum ar fi *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* și *Pseudomonas aeruginosa*, dar nu împotriva bacteriilor Gram-pozitive. Rezistența dobândită împotriva colistinului apare rar, mai mult decât atât, acesta poate preveni dezvoltarea rezistenței împotriva altor antimicrobiene (ex. *aminopenicilinele*, *fluoroquinolonele*) chiar și la nivele de concentrații mai mici decât MIC (concentrația minimă inhibitoare).

Absorbția colistinului din tractusul gastro-intestinal este înceată și limitată și de aceea acționează în primul rând împotriva bacteriilor susceptibile din tractusul gastro-intestinal.

INDICAȚII

COLIPRIM 2400 Pulvis este recomandat pentru administrări orale în tratamentul și prevenția infecțiilor gastro-intestinale cauzate de *E.coli*, *Salmonella spp.* și alte microorganisme susceptibile la colistin, la porcine și păsări.

SPECII ȚINTĂ

Porcine, găini și curcani.

DOZARE ȘI ADMINISTRARE

Dozarea recomandată a produsului este după cum urmează:

Porcine

5 mg colistin sulphate (= 100 000 UI colistin) per kg greutate corporală;

Aceasta corespunde unei doze uzuale de:

- 0,35 – 0,45 g COLIPRIM 2400 Pulvis per litru apă de băut sau per kg furaj.

Găini, curcani

6 mg colistin sulphate (= 120 000 UI colistin) per kg greutate corporală;

Aceasta corespunde unei doze de:

- 0,25 – 0,40 g COLIPRIM 2400 Pulvis per litru apă de băut sau per kg furaj.

În cazuri excepționale doza poate fi mărită până la 0,8-1 g / litru apă de băut sau furaj. Tratamentul trebuie administrat timp de 5 – 7 zile.

SUPRADOZAREA

Supradozarea cu COLIPRIM 2400 Pulvis poate să apară foarte rar, datorită unei bune toleranțe a speciilor țintă la care se administrează. În studiile de toleranță efectuate, produsul nu a determinat inducerea niciunui efect toxic, atunci când a fost administrat într-o doză de trei ori mai mare decât cea recomandată, pe o perioadă de administrare dublă față de durata de tratament recomandată.

CONTRAINDICAȚII

Nu sunt cunoscute.

EFECTE ADVERSE

COLIPRIM 2400 Pulvis este slab toxic, iar efectele adverse / secundare sunt rar semnalate. Dacă apar efecte adverse suspecte, tratamentul va fi întrerupt. În timpul examinărilor toxicologice și a testărilor clinice nu au fost detectate efecte adverse.

PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA

Nu sunt necesare măsuri speciale.

UTILIZARE ÎN TIMPUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI ȘI A PERIOADEI DE OUAT

Siguranța produsului în timpul gestației nu a fost stabilită. Produsul poate fi utilizat și la păsări ouătoare.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ȘI ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu sunt cunoscute interacțiuni de natură negativă ale colistinului sulfat, ca substanță activă a produsului cu alte produse medicinale.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

- Porcine, găini și curcani - țesuturi comestibile: 2 zile.
- Ouă - nu este necesară.

PRECAUȚII

Se va evita expunerea inutilă la produs.

Măinile vor fi spălate după utilizare.

VALABILITATE

Valabilitate de la data fabricării: 2 ani.

Valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

Valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

Valabilitate în furajul medicamentat: 1 lună.

PRECAUȚII PRIVIND DEPOZITAREA

A se păstra la temperaturi între 15 și 25°C, în locuri uscate. A se proteja de lumină.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

AMBALAJ

Flacoane x 100 g (material plastic)

- Plic x10 gr
- Cutii x 1 kg,
- Cutii x 5 kg (material plastic)
- Saci x 10 kg (multistratificați)

Produs de: LAVET PHARMACEUTICALS Ltd, Ungaria