

Doxiprim 40%

pulbere solubilă

COMPOZIȚIE

- Doxycycline hyclate 400,0 g
- Excipienți q.s. până la 1000,0 g

FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru administrări orale.

DESCRIERE

DOXYPRIM 40% este un antibiotic cu spectru larg destinat utilizării la păsări. Substanța activă din compoziție, doxycyclina, este un derivat semi-sintetic de tetraciclina, ce oferă avantaje superioare în comparație cu tetraciclinele clasice: activitate antibacteriană superioară, mult mai bune proprietăți de absorbție și penetrare a țesuturilor.

INDICAȚII

DOXYPRIM 40% Pulbere Solubilă este recomandat pentru administrări orale în tratamentul infecțiilor respiratorii, intestinale și sistemice produse de micro-organisme sensibile la doxycyclina:

- Boala respiratorie cronică / *Mycoplasma gallisepticum*, *E.coli* ;
- Aerosaculita / *Mycoplasma meleagridis*;
- Sinovite infecțioase / *Mycoplasma synoviae*;
- Holera aviară / *Pasteurella multocida*;
- Coriza infecțioasă / *Haemophilus paragallinarum*;
- Colibaciloze / *E. coli*;
- Bordeteloza curcilor / *Bordetella avium*;
- Enterite necrotice / *Clostridium perfringens*;
- Chlamidioza / *Chlamydia psittaci*;
- Prevenirea infecțiilor bacteriene secundare datorate condițiilor de stres: *vaccinări, schimbarea adăpostului, transport.*

La porcine produsul este indicat în tratamentul infecțiilor respiratorii produse de *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* și *Bordetella bronchiseptica*.

SPECII ȚINTĂ (SPC)

Găini, curcani, porci.

DOZARE ȘI ADMINISTRARE

Găini, curcani:

Doza zilnică de 20 mg doxycyclina hyclate per kg greutate corporală administrate în apa de băut, produce o concentrație serică substanțial înaltă decât valorile MIC (concentrația minimă inhibitorie) împotriva majorității germeilor patogeni susceptibili, incluzând *Mycoplasma gallisepticum*, *Pasteurella multocida* și *Chlamydia psittaci*. De aceea doza zilnică recomandată de Doxiprim 40% Pulbere Solubilă la găini și curcani este de 20 mg doxycycline hyclate per kg greutate corporală.

Produsul poate fi administrat ca doză singulară, atunci când necesarul (doza) zilnic este inclus într-o cantitate limitată de apă pe care păsările să o consume într-un interval de 4 – 8 ore sau poate fi administrat continuu în apa de băut, într-o concentrație de 100 – 150 mg / litru.

Porcine

Doza recomandată de Doxiprim 40% Pulbere Solubilă este de 15 mg doxycycline hyclate (adică 100 – 150 mg per litru apă de băut).

În furaj, se recomandă următoarea doză: 200-250 gr Doxiprim 40% / tonă.

Produsul va fi administrat o perioadă de 3 – 5 zile la găini și curcani și o perioadă de 5 - 7 zile la porci.

SUPRADOZARE

În studiile de toleranță produsul nu a indus niciun efect toxic administrat într-o doză de trei ori mai mare pe o perioadă de două ori mai mare (10 zile) decât perioada de tratament recomandată.

Dacă există suspiciuni de reacții datorate unei supradozări extreme, tratamentul trebuie întrerupt și trebuie aplicate tratamente simptomatice adecvate.

CONTRAINDICĂȚII

A nu se utiliza la păsări ouătoare, a căror ouă sunt destinate consumului uman.

EFECTE ADVERSE

DOXIPRIM 40% este slab toxic iar efecte secundare apar rar. Dacă totuși apar unele reacții adverse suspecte, tratamentul va fi întrerupt. În timpul examinărilor toxicologice și a testărilor clinice, nu s-au evidențiat efecte adverse la speciile în cauză.

PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA

Nu sunt necesare măsuri speciale.

UTILIZARE ÎN TIMPUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI ȘI A PERIOADEI DE OUAT

În doza terapeutică Doxycyclina nu are potențial embriotoxic sau teratogen, de aceea poate fi utilizată și în timpul gestației. Nu se va utiliza la păsări aflate în perioada de ouat.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ȘI ALTE FORME DE INTERACȚIUNE

Nu sunt cunoscute interacțiuni de natură negativă cu alte produse medicinale. Spre deosebire de clasicele tetraciline, doxycyclina este puțin susceptibilă a genera interacțiuni cu calciul. În mod corespunzător, absorbția sa nu este afectată în mod semnificativ de ingestia de furaj.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

- Țesuturi comestibile găini și curcani: 4 zile;
- Țesuturi comestibile porci: 3 zile.

PRECAUȚII

Se vor purta mănuși de protecție la manipularea produsului. Se va evita contactul direct cu pielea, ochii și mucoasele. Măinile vor fi spălate după utilizare.

Orice urmă ajunsă pe piele sau ochi va fi îndepărtată imediat prin spălare cu apă.

VALABILITATE

24 luni.

Valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

Valabilitate după dizolvare în apa de băut: 24 ore.

PRECAUȚII PRIVIND DEPOZITAREA

A se păstra în locuri răcoroase, uscate și în recipient închis în siguranță după utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

AMBALAJ

- Flacoane x 100 g (polipropilenă)
- Plic x 10 gr
- Cutii x 1 kg (polipropilenă)
- Saci x 10 kg (multistratificați)

Produs de: LAVET PHARMACEUTICALS Ltd, Ungaria