

Ser Clostetan inj. ad us. vet.

Declararea substanțelor active și a altor ingrediente

1 ml conține:

Substanță activă: Immunoserum tetanicum equinum nativum, min. 300 UI / 1 ml.

Excipient: Fenol - max. 0,5 %.

Indicații

Pentru imunizarea pasivă a animalelor în timpul intervențiilor chirurgicale, tratării plăgilor, etc. Preparatul poate fi utilizat în scop terapeutic la instalarea tetanosului.

Contraindicații

Nu sunt.

Reacții adverse

La locul administrării poate fi observat un edem ușor care dispără spontan în 3 zile. Rare pot părea reacții de soc anafilactic, după administrări repetate. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Cai, vaci, oi, capre, porci, câini și pisici (începând cu vârstă de 6 luni - cai, 4 luni - vaci, 2 luni - ovine, 2 luni - caprine, 2 luni - suine, 6 luni - câini și 6 luni - pisici).

Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

Calea de administrare

Cai, vaci, oi, capre, câini și pisici: subcutanat, intramuscular sau intravenos.

Porci: subcutanat sau intramuscular.

Dozaj

Profilactic

Cai, vaci	4 000 – 6 000 UI (13 - 20 ml)
Oi, capre, porci, câini, pisici	2 000 – 3 000 UI (7 - 10 ml)

Terapeutic

Cai, vaci	40 000 UI (140 ml)
Oi, capre, porci, câini, pisici	20 000 UI (70 ml)

Doza terapeutică se administrează zilnic, timp de 2 - 4 zile, în funcție de starea de sănătate a pacientului.

Imunitatea pasivă durează 7 – 10 zile de la ultima administrare a preparatului.

Recomandări privind administrarea corectă

Volumele mari trebuie divizate și administrate în mai multe locuri. Agitați bine conținutul flaconului înainte de utilizare. Preparatul trebuie adus la temperatura corpului în baie de apă cu puțin timp înainte de administrare.

Timp de așteptare

0 zile.

Precăutări speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra în condiții de refrigerare (2°C - 8°C).

A nu se utilizează după data de expirare înscrisă pe etichetă sau cutie.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 10 ore.

Atenționări speciale

Produsul poate fi utilizat în perioada de gestație sau lactație.

Administrarea unei doze duble nu a evidențiat niciun efect asupra animalelor din speciile ţintă. Un volum mare de preparat aplicat într-un singur loc poate leza ţesuturile adiacente și poate provoca reacții secundare.

Precăutări speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea acestuia trebuie eliminat conform cerințelor locale.

Alte informații

Uz veterinar - Produsul se va elibera pe bază de prescripție medicală veterinară.

Ambalaj

20 ml, 100 ml