

Hypophysin LA

0.07 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine și porcine

INGREDIENTE:

1 ml conține:

Substanța activă: 0,07 mg carbetocin

Excipient: 2 mg clorobutanol hemihidrat

INDICAȚII:

Bovine: contracții slabe. Probleme post fătare rezultate din atonia uterină și alte disfuncționalități puerperale (atonie uterină, lochiometria). În cazul eliminării insuficiente de lapte.

La scroafe: contracții slabe. Probleme post fătare rezultate din atonia uterină, pentru suportul tratamentului în sistemul Mtrit e-Mastite-Agalaxie. În cazul eliminării insuficiente de lapte. Pentru sincronizarea fătărilor în combinație cu PGF_{2a}, dar nu mai repede de ziua a 114-a de gestație.

CONTRAINDICAȚII:

A nu se folosi în situații de fătări îndelungate, deschidere inadecvată a căilor de fătare sau în caz de feteși supradimensionați. Hypophysin LA nu trebuie folosit în situațiile în care cervixul nu este dilatat. Utilizarea de Hypophysin LA nu este indicată în situații de contracții puternice, obstacole mecanice, anomalii de prezentare, de poziționare, contracții convulsive, în caz de rupturi uterine, torsiune uterină, supradimensiuni ale feteșilor, precum și în caz de malformații ale căilor de fătare.

REAȚII ADVERSE:

Nu este cazul.

SPECII ȚINTĂ:

Bovine și porcine.

MOD DE ADMINISTRARE:

Scroafe: 0,5-1,0 ml, i.m., s.c. (echivalent la 35-70 microorganisme de carbetocin)/animal, pentru sincronizarea parturii împreună cu o administrare anterioară de PGF_{2a}.

Bovine: 2,5-5,0 ml (echivalent la 175-350 microorganisme de carbetocin)/animal.

Se va administra prin injecții intramusculare sau intravenoase. În general, se va administra o singură dată.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Bovine și porcine: carne și țesuturi comestibile 0 zile

Bovine: lapte : 0 zile

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Interacțiuni: Oxitocina nu poate fi administrată împreună cu Hypophysin LA din cauza unei creșteri reciproce în potență și efect.

DEPOZITARE:

A nu se folosi după termenul de valabilitate expirat.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A se păstra în frigider (2°C-8°C)

A se utiliza în 28 de zile după prima deschidere.