

## Veyxyl 200 LA inj

200mg/ml, suspensie injectabila pentru suine, caini si pisici

### COMPOZITIA

1 ml de solutie injectabila contine:

Substanta activa : -Amoxicilină 200.00 mg (corespunde la 229.60 mg amoxicilină trihidrat),

Excipienti :

0.08 mg butil hidroxianisol

0.08 mg butil hidraxitoluen

### INDICATII

Pentru tratamentul afectiunilor determinate de germeni Gram-pozitivi si Gram -negativi sensibili la amoxicilina la sunie, caini, pisici in infectiile pulmanare si ale tractului respirator, digestiv, urogenital, infectii generalizate si septicemie, infectii bacteriene secundare consecutive bolilor virale, rujet.

### CONTRAINDICATII

Administrare intravenoasa.

Tratamentul animalelor cu hipersensibilitate la peniciline si cefalosporine.

Insuficienta renala severa cu anurie si oligurie.

Existenta germenilor patogeni care secreta  $\beta$ -lactamaza.

Tratamentul iepurilor, purcelusilor de Guineea, hamsterilor si rozatoarelor mici.

### REACTII ADVERSE

Administrarea preparatelor care contin amoxicilina poate provoca reactiile alergice (reactii alergice cutanate, anafilaxie).

In cazul in care se observa reactii alergice, administrarea de Veyxyl LA 20% trebuie imediat oprita.

In cazuri rare poate apare iritatie la locul injectarii de Veyxyl LA 20%. Frecventa aparitiei de reactii adverse poate fi redusa prin reducerea volumului injectat.

Daca observatii reactii grave sau alte efecte care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam informati medicul veterinar.

### SPECII TINTA

Suine, caini si pisici

### POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru injectare intramusculara la suine, caini si pisici :

10 mg amoxicilina per kg greutate corporala o data pe zi, timp de minimum 3 zile consecutive (10mg amoxicilina per kg greutate corporala sunt echivalente cu 0,5 ml veyxyl LA 20% per 10 kg greutate corporala).

Dupa disparitia simptomelor clinice, tratamentul trebuie continuat pentru inca doua zile.

Daca nu se constata nicio imbunatatire remarcabila dupa o administrare de maxim 3 zile, este necesara o revizuire a diagnosticului si eventual schimbarea tratamentului, daca se impune.

Pentru injectia intramusculara la suine, locul de electie pentru injectare este in musculatura laterala a gatului.

Pentru asigurarea unei dozari corecte, trebuie determinata cu acuratete greutatea corporala a animaloilor, ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

### RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Agitati bine flaconul inainte de utilizare.

### TIMP DE ASTEPTARE

Porci : carne si organe : 28 zile

### PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lasa la indemana copiilor.

A nu se pastra la temperatura mai mare de 25C

A nu se utiliza dupa data expirarii marcata pe cutie si flacon

Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului primar : 28 zile

### ATENTIONARE SPECIALA

*Precautii speciale pentru utilizare la animale*

Folosirea produsului trebuie sa se bazeze pe testarea sensibilitatii bacteriilor izolate de la animalele cu ajutorul antibiografei.

Acest lucru este foarte important, in special in tratamentul infectiilor tractului digestiv, datorita dezvoltarii rezistentei crescute a *E. coli* si *Salmonella* la amoxicilina.

*Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale*

Persoanele sensibile la peniciline sau cefalosporine trebuie sa evite contactul direct al pielii si mucoaselor cu produsul.

*Utilizarea in perioada de gestatie sau lactatie*

Gestatie : studiile de laborator au demonstrat lipsa efectelor teratogene, fetotoxice sau meternotoxice,

Lactatie : poate fi utilizat in timpul lactatiei.

*Interactiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interactiune*

Trebuie evitat amestecul cu alte medicamente pentru a evita eventualele interactiuni.

Ca si efect antibacterian, exista un puternic antagonism intre peniciline si chimioterapicele bacteriostatice cu actiune rapida.

Incompatibilitatile galenice apar in prezenta sulfonamidelor, metalelor grele si agentilor oxidanti.

*Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi) dupa caz*

In caz de supradozare pot apare spasme si excitatii ale sistemului nervos central. Tratamentul cu Veyxyl LA 20% trebuie intrerupt imediat si se va institui tratament simptomatic (administrarea benzodiazepine sau barbiturice ca antidot).

*Incompatibilitati*

Incompatibilitatile galenice apar in prezenta sulfonamidelor, metalelor grele si agentilor oxidanti.

*Ambalaje:*

Flacon din sticla de 100 ml

Cutie de carton cu 1 flacon x 100 ml sau cutie de carton cu 12 flacoane x100 ml.