

Nekro Veyxim

Compoziția

-Chymotrypsină	1.200 FIP-E,
-Trypsină	120 FIP-E,
-Papaină	15 FIP-E.

Forma farmaceutică

Suspensie uleioasă injectabilă.

Indicații

Vaci, viței, porci, purcei, oi, capre, câini: pentru susținerea tratamentelor în infecții bacteriene cu producție de exsudat major, de exemplu: bronchopneumonii, infecții uterine, omfalite, artrite, infecții puerperale, flegmoane, panaritiu, actinomicoze, papilomatoze și în tumori maligne (pre și postoperator).

Contraindicații

Nu se cunosc.

Efecte secundare

În cazul administrării de produse enzimatică prin injecții sau prin administrare intrauterină uneori pot apărea leziuni mai mult sau mai puțin pronunțate. Produsul conține ca și componente active enzime proteolitice: Tripsina, Chimotripsina și papaina. În cazul infecțiilor bacteriene enzimele proteolitice au efect multiplu. Ele dizolvă exsudatele, fibrina, precum și țesuturile necrozate. Țesuturile sănătoase sunt protejate de efectul enzimelor de către antienzime și de 2-macroglobuline. Enzimele proteolitice favorizează penetrarea antibioticelor în țesuturile inflamate și modificate. În condiții *in vitro* și *in vivo*, s-a constatat că agenții sunt distruși pe de o parte de enzimele proteolitice, iar pe de altă parte este redusă virulența germeilor. Totodată enzimele proteolitice sporesc semnificativ efectul administrării de antibiotice. Enzimele proteolitice stimulează sistemul imunitar având efect inclusiv în papilomatoze.

Acestea sunt nedureroase și se caracterizează printr-o reacție puternică tisulară, care va dispărea fără complicații. Dacă totuși se mai constată și alte reacții vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Dozarea și mod de administrare

0,4 ml/10 kg greutate corporală, administrat în mai multe puncte separate în funcție de greutatea animalului. A se administra intramuscular. A se administra de 1-3 ori la interval de 24 de ore; în cazuri de actinomicoză sau papilo-ma-toză se indică a se administra de 3 ori la interval de 8 până la 10 zile.

Timp de așteptare

0 zile.

Păstrare

A se păstra între 8 - 15°C ferit de lumină.

A se agita bine înainte de administrare !

A nu se administra produsul după termenul de valabilitate menționat pe ambalaj !

A se feri de accesul copiilor !

Deșeurile

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare

Flacoane de 50 ml și 100 ml.

Valabilitate

1 an de la data fabricației.

Producător

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germania.

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează pe bază de prescripție medicală.