

Cobactan LC

Unguent intramamar ce conține 75 mg cefquinomă /seringă de 8g pentru vacile în lactație

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands

Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
85716 Unterschleissheim
Germany

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Cobactan LC,
Unguent intramamar ce conține 75 mg cefquinomă /seringă de 8g pentru vacile în lactație.

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE)

Fiecare seringă de 8 grame umplută în prealabil conține:
Substanță activă: Cefquinome 75 m (ca cefquinomă sulfat)

INDICAȚII

La vacile în lactație în tratamentul mastitelor produse de microorganisme sensibile la cefquinomă: *Streptococcus uberis*, *Str. dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*.

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animalele sensibile la cefalosporine sau la alte antibiotice β lactamice.
Nu se utilizează șervețelele de curățat dacă sunt prezente leziuni pe mameloane.

REAȚII ADVERSE

Nu se cunosc.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Vacile în lactație.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Conținutul unei seringi trebuie introdus ușor în mamelonul fiecărui sfert afectat la fiecare 12 ore, trei mulsori succesive.
Se mulg sferturile afectate. După ce se curată și se dezinfectează mameloanul și orificiul mamelonar cu șervețelul de curățare care însoțește produsul, se introduce ușor conținutul unei seringi în fiecare sfert afectat. Se dispersează produsul prin masaj ușor al mamelonului și ugerului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

- Se curăță mameloanele cu șervețele de curățat atașate
 - Pentru inserția parțială se rupe vârful capacului
 - Pentru inserție totală se îndepărtează tot capacul
 - Nu atingeți canula cu degetele. Se introduce cu grijă suspensia uleioasă
- Seringa folosită se aruncă

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne: 2 zile
Lapte eliminat: 84 de ore (7 mulsori)

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

01.2009

ALTE INFORMAȚII

Dimensiunea ambalajului

Cutii cu 3, 15, 20 și 24 seringi.

Șervețelele de curățat sunt incluse în cutii.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.