

Calciveyxol 38

Compoziție:

Fiecare 1 ml conține:

Gluconat de calciu	380 mg,
Acid boric	50 mg,
Clorură de magneziu	60 mg,
Metil-4-hidroxi benzoat	0,35 mg,
Propil-4- hidroxi benzoat	0,12 mg,
Aq. dest. pro inf. ad	1,00 ml.

Indicații:

Condiții de hipocalcemie acută. Pentru suportul tratamentelor în alergii, urticarie, tetanii, paralizie puerperală, eclampsii, febra laptelui, osteomalacii, rahitism, alergii, toxicoze, acetonemii, distocii.

Descriere:

Hipocalcemia la animale este destul de frecvent întâlnită, manifestandu-se secundar diferitelor boli. De multe ori, administrarea de cantități mici de calciu poate duce la îmbunătățirea situației. Dar pe lângă aceasta, administrarea de cantități mai mari poate ajuta și la îmbunătățirea sistemului circulator. În asemenea situații, administrarea unor produse concentrate ajută cel mai mult la realizarea unui efect terapeutic.

Recomandări:

Hipocalcemii de diferite naturi, tetanii, paralizia puerperală, eclampsii, febra laptelui, osteomalacii, rahitism, alergii, urticarii, toxicoze, acetonemii, distocii.

Dozarea și mod de administrare:

Se va administra în infuzii intravenoase sau în injecții subcutanate. La câine se poate administra și intramuscular. Pe cât posibil a se administra la temperatura corporală.

Bovine: în funcție de greutate 200 ml până la max. 500 ml,

Tineret bovin: max. 50 ml / 100 kg,

Porcine: max. 40 ml / 100 kg,

Tineret porcine: max. 10 ml s.c., administrată în mai multe locuri diferite,

Ovine: max. 40 ml, s.c., administrată în mai multe locuri diferite,

Câine: 10 - 40 ml, în funcție de greutatea corporală.

ATENȚIE: Înainte de administrarea intravenoasă, produsul se va ține în baia de apă caldă – pentru a prelua temperatura corporală, iar administrarea se va efectua lent intravenos. Flaconul odată deschis trebuie folosit cât mai repede posibil.

Contraindicații:

Hipercalcemie, hipermagneziemie, hipertonie, probleme cardiace.

Timp de așteptare:

Nu are.

Păstrare:

În loc ferit de îngheț.

Deșeurile:

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare:

Flacoane de 500 ml.

Valabilitate:

2 ani de la data fabricației.

Producător:

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germania.

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !

Numai pentru uz veterinar !