

SPECTAM GEL ORAL

COMPOZITIE:

Spectinomicina (dihidroclorid penhidrat).....5,00g
Excipient pana la.....100,00ml

PROPRIETATI

Spectrul de activitate antimicrobian al spectinomicinei cuprinde germeni Gram negativi, Gram pozitivi si micoplasme. Are o activitate deosebita fata de enterobacterii (coli si salmonele), responsabile de producerea gastroenteritelor la purcei, miei si iezi.

INDICATII

Purcei, miei si iezi: gastroenterite.

MOD DE ADMINISTRARE SI DOZE

Se administreaza pe cale orala.

Tratament curativ:

- pentru varsta de 1-7 zile: 1 doza de 2 ori/zi, timp de 3-5 zile.
- pentru varsta de peste 7 zile: 2 doze de 2 ori/zi, timp de 3-5 zile. (1 doza = 1ml - o apasare pe mansa pompei flaconului)

Tratament preventiv:

- Acelasi dozaj ca mai sus, insa timp de numai 2 zile.

Fiecare apasare pe mansa pompei flaconului elibereaza 1 ml de gel (50 mg spectinomicina).

PERIOADA DE ASTEPTARE

Rinichi, ficat : 8 zile.

Carne : 5 zile.

DEPOZITARE

Pastrati produsul intr-un loc uscat si racoros.

PREZENTARE

Flacon de plastic de 100 ml cu pompa incorporata, flacon 1L.