

Oxifuran

comprimate pentru câini, pisici, porumbei voiajori și de ornament, păsări de colivie și volieră
(peruși, papagali, sticleți)

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

S.C. Romvac Company S.A., Șoseaua Centurii, nr. 7, Voluntari, județul Ilfov, România. Tel.: 021.350.31.06, Fax: 021.350.31.10

e-mail: romvac@romvac.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OXIFURAN, comprimate pentru câini, pisici, porumbei voiajori și de ornament, păsări de colivie și volieră (peruși, papagali, sticleți)

Oxitetraciclină clorhidrică.

Furazolidonă.

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Un comprimat conține:

Substanțe active:

Oxitetraciclină clorhidrică 14 mg

Furazolidonă 4 mg

4. INDICAȚII

La câini și pisici în tratamentul pneumopatiilor și al infecțiilor secundare asociate parvovirozei produse de microorganisme sensibile la substanțele active sau al infecțiilor cu unele protozoare (*Trichomonas* spp., *Giardia* spp., coccidii). La porumbeii voiajori și de ornament, la păsările de colivie și voliera (peruși, papagali, sticleți) se utilizează în tratamentul coccidiozei și al trichomonozei.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Se va evita tratarea animalelor cu insuficiență renală sau a celor cu vârstă înaintată.

Nu se administrează la cățelii sugari.

Nu se administrează la porumbeii destinați consumului uman.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, porumbei voiajori și de ornament, păsările de colivie și voliera (peruși, papagali, sticleți).

8. DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se utilizează ca atare sau sfărmat sub formă de suspensie în apa de băut, în următoarele doze:

La câine și pisică: 1/2 comprimat/kg greutate vie, timp de 3-5 zile;

La porumbeii voiajori și de ornament, păsările de colivie și voliera: 1/2 comprimat/0,5 kg greutate vie, timp de 5-7 zile.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor respecta dozele recomandate.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Folosirea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație sau în perioada de ouat

Utilizarea în perioada de gestație: a nu se utiliza în ultima parte a gestației.

Utilizarea în perioada de lactație: se va face pe baza evaluării balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar

Utilizarea în perioada de ouat: nu este aplicabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Produsul nu trebuie administrat simultan cu antiacide pe bază de aluminiu sau cu preparate ce conțin Ca, Mg sau Fe, datorită apariției reacțiilor de chelatare cu tetracilinele.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. ALTE INFORMAȚII

Mod de prezentare: flacoane de polietilenă de înaltă densitate cu 100 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.