

## Butox<sup>®</sup> 50

### Soluție insecticidă cu deltametrin.

#### Descriere

**Butox<sup>®</sup> 50** se prezintă sub forma unui recipient de aluminiu ce conține o suspensie gălbuie cu miros pătrunzător.

#### Compoziție

100 ml conțin 5 g deltametrin.

#### Indicații

De parazitarea externă a bovinelor, ovinelor și suinelor prin îmbăiere sau pulverizare.

#### Mod de acțiune

Previne și tratează infestațiile cu ectoparaziți. Este un antiparazitar extern cu acțiune neurotoxică asupra ectoparaziților: căpușe, păduchi, scabie, purici, etc.

#### Doze și mod de administrare

Se aplică prin pulverizare sau prin îmbăierea animalelor. Se recomandă o prediluție înainte de realizarea soluției finale pentru îmbăiere sau pulverizare. Completarea băii se realizează în momentul pierderii a 10% din volumul inițial. La pulverizare se utilizează 3 L de soluție/animal și se insistă în locurile preferate de paraziți.

Concentrația de **Butox<sup>®</sup> 50** recomandată și cantitatea necesară pentru 1000 L de apă:

Specie paraziți	Concentrație Butox 50	Pulverizare	Îmbăiere		Frecvența tratamentului
			Soluția inițială	Soluția de completare	
Scabie - preventiv Scabie - curativ	30 ppm 50 ppm	600 ml 1000 ml	600 ml 1000 ml	900 ml 1500 ml	2 tratamente la 6 luni 2 tratamente la 10 zile
Căpușe	25 ppm	500 ml	500 ml	750 ml	2 tratamente la 15 zile, apoi în funcție de infestație
Păduchi	12,5 ppm	250 ml	250 ml	375 ml	1 tratament asigură o protecție de 6-8 săptămâni
Muște	12,5 ppm	500 ml	500 ml	750 ml	1 tratament asigură o protecție de 6-8 săptămâni

#### Contraindicații

Nu se îmbăiază animalele oboșite sau însetate.

#### Efecte adverse

Nu sunt.

#### Incompatibilități și interacțiuni

Nu se combină cu alte insecticide.

#### Precauții

Tratamentul nu se efectuează în orele călduroase ale zilei. Persoanele care manipulează produsul vor evita contactul cu pielea sau ochii. În timpul manipulării este interzis fumatul, consumul de mâncare sau lichide.

#### Perioada de așteptare

Nu este cazul.

#### Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

#### Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C), la întuneric și ferit de surse de căldură sau foc. Nu se depozitează împreună cu alimente, apă sau furaje.

#### Prezentare

Flacon de 1 L.

#### Precauții pentru produsul neutilizat și ambalaje

Bidoanele se clătesc foarte bine. Produsele reziduale și apa de clătit se îngroapă la o adâncime de 30 cm, la 50 m depărtare de orice sursă de apă sau de fermele piscicole.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.