

Erythromycin 5%

Compoziție

100 grame de produs conțin:

Substanță activă:

5 g eritromicină (ca tiocianat);

Excipienții:

Aromă de ulei de scorțișoară, amarant, citrat de sodiu, lauril sulfat de sodiu, zahăr granular.

Indicații

Pentru prevenirea și tratamentul următoarelor boli:

Pui de găină: boala respiratorie cronică, coriza infecțioasă, sinovită infecțioasă, pasteureloză, micoplasmoză, infecții stafilococice și streptococice.

Curci: aerosaculită, rujet, pasteureloză, sinovită infecțioasă, infecții stafilococice și streptococice.

Contraindicații - reacții adverse

A nu se administra la găini ouătoare ce produc ouă pentru consum uman. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Administrare și dozare

Administrare prin apa de băut.

Eritromicina este administrată la păsări în doză de 300 - 500 mg per litru de apă de băut.

Preventiv: 6 g ERYTHROMYCIN w.s.p. 5% per 1 litru de apă de băut pentru 3 zile.

Tratament: 10 g ERYTHROMYCIN w.s.p. 5% per 1 litru de apă de băut pentru 4-5 zile.

Timp de așteptare

Carne: 28 zile.

Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra la rece, în loc uscat, protejat de lumină.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Producător

VETERIN S.A

19300 Aspropyrgos P.O BOX 26, Atena

TEL: +30 210 5575770, FAX: +30 210 5575830