

Pangolamin[®] inj.

Pulbere hidrosolubilă; cabaline, bovine, ovine, caprine, porci, câini, pisici.

Compoziție

1 ml conține:

Substanța activă

Procain penicilină G 300 000 U.I.

Excipienți

Ester metilic al acidului 4-hidroxibenzoic, citrat de sodiu dihidrat, lecitină, polivinil pirolidonă, sare de etilenediamină tetra disodică de acid acetic, tiosulfat de sodiu. 5H₂O, dihidrogen fosfat de potasiu, apă pentru preparate injectabile.

Indicații

Pangolamin este indicat în tratamentul infecțiilor cauzate sau asociate cu bacterii sensibile la penicilină. Este în principal indicat pentru tratamentul mastitelor, infecțiilor sistemice și locale ale tuturor speciilor, determinate de streptococi, stafilococi și *Corynebacterium pyogenes*. Este de asemenea utilizat pentru tratamentul pielonefritelor și actinomicozelor la bovine, rujetului la suine, nefritelor leptospirice și avortului vibrionic.

Contraindicații

A nu se administra la animale cunoscute cu hipersensibilitate la penicilină și cefalosporine.

A nu se administra Pangolamin intravenos.

Reacții adverse

Reacții de hipersensibilitate, edem trecător și durere la locul administrării intramusculare. Voma și anorexie pasageră la purcei sugari și la cei la îngrășat.

Ocazional pot apare reacții alergice după administrarea de penicilină. Antihistaminicele și adrenalina ajută la revenirea din astfel de situații.

Dacă se observă orice alt efect nemenționat în acest prospect vă rugăm informați medicul dumneavoastră veterinar.

Specii țintă

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porci, câini, pisici.

Doze recomandate pentru fiecare specie în parte, căi de administrare și mod de administrare

Procain penicilina se administrează în doze de la 5.000 la 25.000 U.I./kg g.v. În cazuri grave și în infecții acute doza poate fi crescută și/sau repetată la intervale mai frecvente în funcție de sfatul medicului.

PANGOLAMIN poate fi administrat în următoarele doze:

Bovine, cabaline: 1 - 2,5 ml / 50 kg g.v.

Viței, suine, ovine, caprine: 1 - 2 ml / 25 kg g.v.

Câini, pisici: 1 ml / 12 kg g.v.

Se administrează intramuscular și se repetă la 24 de ore.

Se poate utiliza pe cale intramamară la bovine, ovine și caprine, în următoarele doze :

Vaci 3 - 5 ml / sfert;

Oi, capre 1,5 ml / mamelon.

A se agita înainte de utilizare.

Recomandări privind administrarea corectă

Nu este cazul.

Timp de așteptare

Carne

Bovine 5 zile

Ovine, caprine 5 zile

Suine 5 zile

Lapte

96 ore

Precauții speciale pentru depozitare

Ase păstra în locuri uscate și răcoase, ferit de lumină.

Atentionare specială

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deșeurilor

Întrebați medicul dumneavoastră veterinar cum să îndepărtați produsele medicinale neutilizate. Aceste măsuri pot ajuta la protecția mediului.

Alte informații

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

Mod de ambalare

Flacoane de 20 ml și 100 ml.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Numai pentru uz veterinar.

Producător

VETERIN S.A, 19300 Aspropyrgos P.O BOX 26, Atena, TEL: +30 210 5575770, FAX: +30 210 5575830