

# Stozzon-L

**Pulbere hidrosolubilă pentru bovine, ovine, caprine, suine, găini, câini și pisici.**

## Compoziție

1 gram de pulbere conține 200 mg levamisol HCL

## Indicații

Levamisolul este un antihelmintic cu spectru larg, utilizat în tratamentul și prevenirea infestațiilor cu nematode. Stozzon-L 20% pulbere poate fi utilizat în bolile parazitare gastro-intestinale și pulmonare determinate de formelor mature și imature ale organismelor sensibile la tratamentul cu levamisol.

### Rumegătoare

*Haemonchus sp., Trichostrongilus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., Neoascaris vitulorum, Chabertia ovina, Oesophagostomum sp., Dictiocaulus sp*

### Suine

*Ascaris suum, Strongiloides ransomi, Metastrongilus sp., Hiostrongilus rubidus, Oesophagostomum sp., Clobocephalus urosubulatus, Stephanurus dentatus (forme mature).*

### Păsări

*Ascaridia sp., Heterakis sp., Capillaria sp., Amidostomum anseris.*

### Câini, pisici

*Toxocara sp., Toxascaris leonina, Ancilostoma sp., Uncinaria stenocephala, Ollulanus tricupsis, Capillaria aerophila, Angiostrongilus vasorum, Aelurostrongilus abstrusus, Filaroides osleri, Crenosoma vulpis.*

Levamisolul are efect imunostimulent iar administrarea simultană cu vaccinuri împotriva clostridiilor conduce la îmbunătățirea titrului de anticorpi.

## Mod și cale de administrare

Se administrează în furaj sau în apa de băut în următoarele doze:

*Bovine, ovine, caprine:* 7,54 mg/kg g.v. sau 1,5 g Stozzon-L 20% pulbere /40 kg g.v., doză unică.

*Suine:* 8,25 mg/kg g.v. sau 1 g Stozzon-L 20% pulbere/25 kg g.v, doză unică.

*Galni:* 20 mg/kg g.v. sau 172 g Stozzon-L 20% pulbere/100 litri apă de băut împotriva *Ascaridia sp* și *Heterakis sp*, doză unică.

30 mg /kg g.v. sau 250 g Stozzon-L 20% pulbere/100 litri apă de băut împotriva *Capillaria sp*, doză unică.

*Câini:* 2,5 -10 mg /kg g.v. sau 0,125 - 0,5 g Stozzon-L 20% pulbere/10 kg g.v., doză unică.

10 mg/kg g.v. sau 5 g Stozzon-L 20% pulbere pe 10 kg g.v. împotriva *Dirofilaria sp*, de două ori pe zi, timp de 14 zile

*Pisici:* 5 -10 mg /kg g.v. sau 0,125 - 0,25 g Stozzon-L 20% pulbere/5 kg g.v., doză unică.

## Timp de așteptare

Carne: 28 zile.

## Atenționări speciale

A nu se administra la ecvine.

Timp de 72 de ore de la terminarea tratamentului cu STOZZON-L 20% nu se administrează CCl<sub>4</sub>, Hexaclorofan, Bithionol Sulfoxid.

## Condiții speciale de depozitare

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C și în loc uscat.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

**A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.**

**Numai pentru uz veterinar.**

## Producător

VETERIN S.A

19300 Aspropyrgos P.O BOX 26, Atena

TEL: +30 210 5575770, FAX: +30 210 5575830