

Biocan B

Compoziția:**Substanțe active:**

<i>Borrelia burgdorferi</i> inactivată:	<i>Borrelia garinii</i>	3 – 15 x 10 ^{8,0}
	<i>Borrelia afzelii</i>	3 – 15 x 10 ^{8,0}

Adjuvanți:

Algedratum 2 %
Natrii chloridi solutio

Speciile țintă

Câinii.

Indicații

Pentru imunizarea activă a câinilor împotriva bolii lui Lyme începând cu vârsta de 12 săptămâni.

Dozare

1 ml indiferent de vârstă, greutate sau rasă, dar nu mai devreme de 12 săptămâni. Cățelele gestante nu trebuie vaccinate. Administrați vaccinul subcutanat, în zona scapulo-humerală sau intramuscular, în mușchii membrului pelvin. În cazul vaccinării primare, revaccinarea se va efectua în 14 - 21 zile. Pentru menținerea imunității, se va face revaccinarea anual. Schema de vaccinare se va elabora de către medicul veterinar, în funcție de situația epizootică respectivă.

Metoda de administrare

Subcutanat sau intramuscular.

Precauții pentru utilizare

Înainte de utilizare agitați bine conținutul flaconului.

După prima vaccinare, revaccinarea se va efectua în 14 – 21 zile. Pentru menținerea imunității, se va revaccina anual. Schema de vaccinare se va elabora de către medicul veterinar, în funcție de situația epizootică respectivă.

Contraindicații

Animalele bolnave clinic sau caectice. Nu utilizați în perioada gestației sau a lactației.

Efecte secundare

În timpul testărilor vaccinului Biocan B, nu au apărut efecte secundare. După vaccinare, se poate observa uneori, la locul de inoculare, formarea unei mici umflături cât un bob de mazăre, care dispare de la sine în trei săptămâni. La unii indivizi se poate observa hipersensibilitate.

Timp de așteptare

Nu este destinat animalelor de consum.

Păstrare

Depozitați într-un loc uscat și întunecos, la temperatura de 2°C - 8°C. Vaccinul nu trebuie înghețat !

Atenționări speciale

Câinii având anticorpi împotriva boreliozei Lyme pot fi vaccinați pentru a-i proteja împotriva infecției posibile și a manifestării clinice a boreliozei. Câinii la care s-a demonstrat deja existența boreliozei clinice, de exemplu prin contaminarea cu *Borrelia* de la indivizii bolnavi, reprezintă grupul de risc din punct de vedere al vaccinării. Asemenea animale nu trebuie vaccinate pentru că vaccinul nu va avea eficacitate asupra animalelor vaccinate (germenii de *B. burgdorferi* rămân ascunși în tulpini bine protejate, de exemplu în cartilajul articular, pentru întreaga viață a câinelui, nefiind posibilă nicio vaccinare); așadar, asemenea vaccinări sunt sortite eșecului, pentru că se poate induce borelioza (stress, alte boli infecțioase, etc.) și boala poate apărea în ciuda efectuării vaccinului.

Condiții speciale pentru manipularea deșeurilor și a produselor medicinale veterinare rezultate

Manipularea ambalajului și a oricărui rest din preparat se va face conform reglementărilor în vigoare.

Alte informații

Vaccinul Biocan B nu trebuie amestecat cu un alt produs medicinal veterinar.

Se poate administra simultan și cu alt produs din seria Biocan, dar întotdeauna separat, de preferat pe partea opusă a corpului.

Prezentare

Nu toate tipurile de ambalaj pot fi comercializate.

2 flacoane × 1ml

10 flacoane × 1ml

20 flacoane × 1ml

50 flacoane × 1ml

100 flacoane × 1ml.

Pentru orice alte informații despre acest produs, vă rugăm să contactați reprezentantul zonal.

Valabilitate

24 luni.

Producător:

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.