

## Biocan C inj. ad us. vet.

### Vaccin viu inactivat împotriva coronavirozei canine.

#### Compoziția:

Fiecare 1 ml conține:

- Coronavirus canis inactivat (cel puțin  $10^{6.5}$  TCID<sub>50</sub>),
- 2 % hidroxid de aluminiu,
- tiomersal,
- mediu de cultură.

#### Modul de acțiune:

După patrunderea în organismul animal, antigenul conținut în vaccin este detectat ca și un agent străin și ca urmare se activează o serie de mecanisme de apărare ale organismului (macrofage, opsonine, interleukine, limfocite B, etc.) datorită cărora se formează anticorpi specifici față de antigenii determinanți conținuți în vaccin. Acești anticorpi specifici vor preveni infecțiile ulterioare după contaminarea cu coronavirusul canin.

#### Indicații:

Pentru prevenirea și imunizarea profilactică a câinilor împotriva coronavirozei canine.

#### Contraindicații:

Boli febrile grave.

#### Precauții speciale:

Vaccinul **Biocan C** aparține grupului de vaccinuri virale inactivate care în mod normal nu determină reacții adverse. La un număr limitat de indivizi se pot întâlni totuși răspunsuri de hipersensibilitate care se pot remedia prin tratament clasic.

#### Interacțiuni:

Nu se cunosc.

#### Calea de administrare:

Subcutanată.

#### Dozarea și mod de administrare:

1 ml indiferent de vârstă, greutate corporală și rasă.

#### Efecte secundare:

În timpul testării vaccinului **Biocan C** nu s-au semnalat reacții adverse. La locul de inoculare se poate produce totuși o reacție locală (de mărirea unui bob de mazăre) care dispare de la sine în decurs de cca. 3 săptămâni. Nu este exclus un răspuns de hipersensibilitate la unii indivizi care se poate trata clasic.

#### Schema de vaccinare:

Schema de vaccinare trebuie stabilită de către medicul veterinar în funcție de statusul epizootic și nivelul protecției pasive colostrale al indivizilor vaccinați. Animalele care au fost vaccinate pentru prima dată, trebuie revaccinate cel puțin o dată la un interval de 14 – 21 zile. Revaccinarea trebuie repetată în fiecare an pentru menținerea permanentă a imunității.

Vaccinul **Biocan C** poate fi administrat separat, simultan sau grupat cu alte vaccinuri din seria Biocan:

- Vaccinul **Biocan C** poate fi folosit ca și diluant pentru vaccinurile liofilizate de tip Biocan (de exemplu DHPPi, DHP, DP, DH, P).
- Vaccinul **Biocan C** poate fi administrat împreună cu alte vaccinuri lichide de tipul Biocan (LR, L, Puppy). În acest caz se va folosi doză vaccinală de 2 ml.
- Vaccinul **Biocan C** asociat cu vaccinurile lichide Biocan LR sau L poate fi folosit ca și diluant pentru vaccinurile Biocan liofilizate. În acest caz se va folosi doza vaccinală de 2 ml.

#### Alte vaccinări posibile:

Biocan M – Vaccin inactivat pentru *Microsporium canis*, poate fi utilizat începând cu vârsta de 12 săptămâni.

#### Schema de vaccinare biocan recomandată:

| Vârsta cățelului   | Status epizootic |                             |                         |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    | Favorabilă       | Nefavorabilă<br>Parvoviroză | Nefavorabilă<br>Jigodie |
| 5 - 6 săptămâni    |                  | Puppy (P) + C               | Puppy (DP, DHPPi) + C   |
| 7 - 8 săptămâni    |                  | Puppy (P) + C               | Puppy (DP, DHPPi) + C   |
| 8 -10 săptămâni    | DHPPi + L        | DHPPi + L                   | DHPPi + L               |
| 12 -16 săptămâni   | DHPPi + LR (R)   | DHPPi + LR (R)              | DHPPi + LR (R)          |
| Revaccinare anuală | DHPPi + LR (R)   | DHPPi + LR (R)              | DHPPi + LR (R)          |

**Notă:**

DHPPi – Vaccinul selectat (valențele nu sunt separate prin virgule)

Vaccinurile din paranteze înseamnă posibilitatea utilizării vaccinurilor alternative în locul vaccinului B. Puppy;

Vaccinurile însemnate cu +C, +L, +LR înseamnă posibilitatea administrării simultane sau în combinație cu alte vaccinuri Biocan (de exemplu DHPPi, DHP, DP, DH, P, Puppy).

**Deșeurile:**

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

**Păstrare:**

Depozitați într-un loc întunecat și uscat, la temperatura de 2 - 8°C.

Vaccinul nu trebuie înghețat !

Nu utilizați produsul după data expirării trecută pe etichetă.

**Timp de așteptare:**

Nu este destinat animalelor de consum.

**Prezentare:**

- A) Cutii de plastic cu 10 flacoane  
10 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan C;
- B) Cutii de plastic cu 20 flacoane  
20 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan C;
- C) Cutii de plastic cu 100 flacoane  
50 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan C,  
100 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan C.

Prospectul este atasat la fiecare ambalaj.

**Valabilitate:**

2 ani de la data fabricației.

**Producător:**

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !