

Biocan M inj. ad us. vet.

Vaccin împotriva *Microsporium canis* la câini și pisici.

Compoziția:

Fiecare 1 ml conține:

- Microsporium canis* inact. min. 500.000 forme vegetative,
- algeldratum,
- soluție de clorura de sodiu.

Speciile de animale țintă:

Câini și pisici.

Indicații:

Pentru profilaxia și tratamentul micozei cutanate la câini și pisici, determinată de dermatofitul *Microsporium canis*, începând cu vârsta de 12 săptămâni.

Contraindicații:

Boli febrile grave. Nu este recomandată vaccinarea cățelelor și a pisicilor gestante. Alte imunizări profilactice, cu o săptămână înainte de prima vaccinare și 14 zile după cea de-a doua (sau a treia) vaccinare (în afară de vaccinările cu produsele Biocan).

Interacțiuni:

Administrați **Biocan M** întotdeauna separat (să nu-l utilizați niciodată ca și diluant pentru vaccinurile liofilizate sau în amestec cu alte vaccinuri lichide Biocan). Oricare alt vaccin Biocan (Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPPi, L, R, LR, C) poate fi administrat simultan cu **Biocan M** într-un punct separat (de preferat pe partea opusă).

Dozarea pe specii:

1 ml indiferent de vârstă, greutatea sau rasa animalului. Animalelor inoculate li se induce imunitatea celulară și parțial umorală. Imunitatea se formează în decurs de o lună după revaccinare și durează cel puțin un an. Pentru menținerea imunității permanente se recomandă vaccinarea anuală. Animalele vaccinate pentru prima dată trebuie revaccinate cel puțin o dată într-un interval de 14 – 21 zile. În cazul vaccinării terapeutice, se va efectua o a treia vaccinare la 18 – 24 zile după revaccinare, dacă este necesar.

Dozarea și mod de administrare:

Câini: strict intramuscular, în mușchii membrului pelvin.

Pisici: subcutanat, într-un punct dinapoia spetei sau intramuscular, în mușchii membrului pelvin.

Este de preferat să se facă vaccinarea pe partea stângă a corpului, astfel ca revaccinarea să se efectueze pe partea dreaptă.

Efecte secundare:

La locul de inoculare se poate observa uneori o reacție locală (de mărimea unui bob de mazăre) care dispare în trei săptămâni. Numai excepțional se poate constata hipersensibilitate.

Timp de așteptare:

Nu este destinat animalelor de consum.

Păstrare:

Depozitați într-un loc întunecat și uscat, la temperatura de 2 - 8°C.

Vaccinul nu trebuie înghețat !

Nu utilizați produsul după data expirării trecută pe etichetă.

Atenționări speciale privind efectele posibile asupra comportamentului animalului:

Nu este cazul.

Deșeurile:

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Prezentare:

Cutii de plastic cu capac:

- 100 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan M,
- 50 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan M,
- 20 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan M,
- 10 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan M,
- 2 flacoane x 1 ml de vaccin Biocan M.

Prospectul este atașat la ambalaj.

Valabilitate:

2 ani de la data fabricației.

Producător:

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !